



Vademécum 2025

ÍNDICE

MARCAS

Alergias

- Alflexa Comprimidos Recubiertos 120 mg (Fexofenadina Clorhidrato)	12
- Alflexa Comprimidos Recubiertos 180 mg (Fexofenadina Clorhidrato)	12
- Bilakem Comprimidos 20 mg (Bilastina)	12
- Cetirex Comprimidos Recubiertos 10 mg (Cetirizina Diclorhidrato)	12
- Lezitar Comprimidos Recubiertos 5 mg (Levocetirizina Diclorhidrato)	13
- Olokem Solución Oftálmica 0,2% (Olopatadina)	13
- Tamides Comprimidos Recubiertos 5 mg (Desloratadina)	13
- Tremecort Crema Tópica 0,1% (Mometasona Furoato)	14

Analgésicos

- Coxira Cápsulas 200 mg (Celecoxib)	15
- Dolad Suspensión Oral 200 mg/5 mL (Ibuprofeno)	15
- Kenatrum Comprimidos Recubiertos 37,5/325 mg (Tramadol Clorhidrato/Paracetamol)	15

Antiglaucomatosos

- Brimokem Solución Oftálmica 0,2% (Brimonidina)	16
- Dorzox Solución Oftálmica 2 % (Dorzolamida Clorhidrato 20 mg/mL)	16
- Dorzox T Solución Oftálmica (Dorzolamida/Timolol)	16

Antiinfecciosos

- Azithral Comprimidos Recubiertos 500 mg (Azitromicina)	17
- Bectaclem Crema Tópica (Clotrimazol/Betametasona Dipropionato)	17
- Ciproskend Solución Oftálmica 0,3% (Ciprofloxacino)	17
- Cleomycin Gel Tópico 1% (Clindamicina)	18
- Flukem Cápsulas 75 mg (Oseltamivir)	18
- Impracid Polvo para Solución Inyectable (Cilastatina/Imipenem)	18
- Moxivulan Comprimidos Recubiertos 875/125 mg (Ácido Clavulánico/Amoxicilina)	19
- Pluricef Comprimidos Recubiertos 200 mg (Cefpodoxima)	19
- Premoxin Solución Oftálmica 0,5% (Moxifloxacino)	19
- Viprovir Comprimidos Recubiertos 500 mg (Valaciclovir)	20

Cardiovascular

- Amlipros Comprimidos Recubiertos 5/40 mg (Amlodipino/Olmesartán Medoxomilo)	21
- Amlipros Comprimidos Recubiertos 10/40 mg (Amlodipino/Olmesartán Medoxomilo)	21
- Biprosel Comprimidos Recubiertos 1,25 mg (Bisoprolol Fumarato)	21
- Biprosel Comprimidos Recubiertos 2,5 mg (Bisoprolol Fumarato)	21
- Biprosel Comprimidos Recubiertos 5 mg (Bisoprolol Fumarato)	21
- Clopikem Comprimidos Recubiertos 75 mg (Clopidogrel)	22

ÍNDICE

Cardiovascular

- Clotakem Comprimidos 50 mg (Clortalidona)	23
- Dabitrom Cápsulas 75 mg (Dabigatrán Etxilato)	23
- Dabitrom Cápsulas 150 mg (Dabigatrán Etxilato)	23
- Irkem Comprimidos Recubiertos 150 mg (Irbesartán)	24
- Irkem Comprimidos Recubiertos 300 mg (Irbesartán)	24
- Meprokem Comprimidos de Liberación Prolongada 25 mg (Metoprolol Tartrato)	24
- Meprokem Comprimidos de Liberación Prolongada 50 mg (Metoprolol Tartrato)	24
- Olmepress Comprimidos Recubiertos 20 mg (Olmesartán)	25
- Olmepress Comprimidos Recubiertos 40 mg (Olmesartán)	25
- Olmepress D Comprimidos Recubiertos 20/12,5 mg (Olmesartán/Hidroclorotiazida)	25
- Olmepress D Comprimidos Recubiertos 40/12,5 mg (Olmesartán/Hidroclorotiazida)	25
- Texinal Comprimidos 40 mg (Telmisartán)	25
- Texinal Comprimidos 80 mg (Telmisartán)	25
- Valkem Comprimidos Recubiertos 80 mg (Valsartán)	26
- Valkem Comprimidos Recubiertos 160 mg (Valsartán)	26
- Valkem D Comprimidos Recubiertos 80/12,5 mg (Valsartán/Hidroclorotiazida)	26
- Valkem D Comprimidos Recubiertos 160/12,5 mg (Valsartán/Hidroclorotiazida)	26
- Valmira Comprimidos Recubiertos 5/80 mg (Amlodipino/Valsartán)	27
- Valmira Comprimidos Recubiertos 5/160 mg (Amlodipino/Valsartán)	27
- Valmira Comprimidos Recubiertos 10/160 mg (Amlodipino/Valsartán)	27
- Zotaban Comprimidos Recubiertos 10 mg (Rivaroxabán)	27
- Zotaban Comprimidos Recubiertos 15 mg (Rivaroxabán)	27
- Zotaban Comprimidos Recubiertos 20 mg (Rivaroxabán)	27

Gástrico

- Esoflux Cápsulas con Gránulos con Recubrimiento Entérico 20 mg (Esomeprazol)	28
- Esoflux Cápsulas con Gránulos con Recubrimiento Entérico 40 mg (Esomeprazol)	28
- Librin-C Cápsulas 5/2,5 mg (Clordiazepóxido Clorhidrato/Bromuro de Clidinio)	28

Hiperuricemia

- Buxend Comprimidos Recubiertos 40 mg (Febuxostat)	29
- Colkem Comprimidos 0,5 mg (Colchicina)	29

Inmunosupresores

- Crolim Cápsulas 0,5 mg (Tacrolimus)	30
- Crolim Cápsulas 1 mg (Tacrolimus)	30
- Crolim Cápsulas 5 mg (Tacrolimus)	30
- Eminod Cápsulas 0,5 mg (Fingolimod Clorhidrato)	30
- Evescend Comprimidos 0,25 mg (Everolimus)	30

ÍNDICE

Inmunosupresores

- Evescend Comprimidos 0,5 mg (Everolimus)	30
- Evescend Comprimidos 0,75 mg (Everolimus)	30
- Inmufen Cápsulas 250 mg (Micofenolato Mofetilo)	31
- Inmufen Comprimidos Recubiertos 500 mg (Micofenolato Mofetilo)	31
- Panimun Bioral Cápsulas Blandas 25 mg (Ciclosporina)	31
- Panimun Bioral Cápsulas Blandas 100 mg (Ciclosporina)	31

Metabólicos

- Forlip Comprimidos Recubiertos 10 mg (Rosuvastatina)	32
- Forlip Comprimidos Recubiertos 20 mg (Rosuvastatina)	32
- Glikem Comprimidos de Liberación Prolongada 60 mg (Gliclazida)	32
- Glimefor Comprimidos Recubiertos 850 mg (Metformina Clorhidrato)	33
- Glimefor Comprimidos Recubiertos 1000 mg (Metformina Clorhidrato)	33
- Glimefor XR Comprimidos de Liberación Prolongada 500 mg (Metformina Clorhidrato)	33
- Glimefor XR Comprimidos de Liberación Prolongada 750 mg (Metformina Clorhidrato)	33
- Glimefor XR Comprimidos de Liberación Prolongada 1000 mg (Metformina Clorhidrato)	33
- Glimekem Comprimidos 4 mg (Glimepirida)	34
- Sitakem Comprimidos Recubiertos 50 mg (Sitagliptina)	34
- Sitakem Comprimidos Recubiertos 100 mg (Sitagliptina)	34
- Sitakem - M Comprimidos Recubiertos 50/500 mg (Sitagliptina/Metformina Clorhidrato)	35
- Sitakem - M Comprimidos Recubiertos 50/1000 mg (Sitagliptina/Metformina Clorhidrato)	35
- Sitakem-M XR Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 50/500 mg (Sitagliptina/Metformina Clorhidrato)	35
- Sitakem-M XR Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 50/1000 mg (Sitagliptina/Metformina Clorhidrato)	35
- Sitakem-M XR Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 100/1000 mg (Sitagliptina/Metformina Clorhidrato)	35
- Toresta Comprimidos Recubiertos 40 mg (Atorvastatina)	36
- Toresta Comprimidos Recubiertos 80 mg (Atorvastatina)	36
- Zetirol Comprimidos 10 mg (Ezetimiba)	37
- Zetirol S Comprimidos 10/10 mg (Ezetimiba/Simvastatina)	37
- Zetirol S Comprimidos 10/20 mg (Ezetimiba/Simvastatina)	37

Oncológicos

- Brecasta Solución Concentrada para Perfusión 80 mg/2 mL, con Solvente (Docetaxel)	38
- Brezar Liofilizado para Solución Inyectable 1000 mg (Gemcitabina)	39

ÍNDICE

Respiratorio

- Amrodil Jarabe 15 mg/5 mL (Ambroxol Clorhidrato) 40
- Amrodil Jarabe 30 mg/5 mL (Ambroxol Clorhidrato) 40
- Lukem Comprimidos Masticables 5 mg (Montelukast) 40
- Lukem Comprimidos Recubiertos 10 mg (Montelukast) 40

Salud Femenina

- Gestrokem Comprimidos 1,5 mg (Levonorgestrel) 41
- Gestrokem-E 28 Comprimidos Recubiertos (Etinilestradiol/Levonorgestrel) 41

Salud Masculina

- Erxya Comprimidos Recubiertos 20 mg (Tadalafilo) 42
- Erxya Comprimidos Recubiertos 5 mg (Tadalafilo) 42
- Finaflux Comprimidos Recubiertos 1 mg (Finasterida) 42
- Finaflux Comprimidos Recubiertos 5 mg (Finasterida) 42

Sistema Nervioso

- Anzap Comprimidos Recubiertos 5 mg (Olanzapina) 43
- Anzap Comprimidos Recubiertos 10 mg (Olanzapina) 43
- Aroxime Comprimidos Recubiertos 20 mg (Paroxetina) 43
- Brexakem Comprimidos Recubiertos 0,25 mg (Brexipirazol) 44
- Brexakem Comprimidos Recubiertos 0,5 mg (Brexipirazol) 44
- Brexakem Comprimidos Recubiertos 1 mg (Brexipirazol) 44
- Brexakem Comprimidos Recubiertos 2 mg (Brexipirazol) 44
- Brexakem Comprimidos Recubiertos 3 mg (Brexipirazol) 44
- Brexakem Comprimidos Recubiertos 4 mg (Brexipirazol) 44
- Citam Comprimidos Recubiertos 10 mg (Escitalopram) 44
- Citam Comprimidos Recubiertos 20 mg (Escitalopram) 44
- Coxepa Comprimidos Recubiertos 300 mg (Oxcarbazepina) 45
- Coxepa Comprimidos Recubiertos 600 mg (Oxcarbazepina) 45
- Diprotan Cápsulas con Gránulos con Recubrimiento Entérico 30 mg (Duloxetina) 45
- Diprotan Cápsulas con Gránulos con Recubrimiento Entérico 60 mg (Duloxetina) 45
- Donap Comprimidos Recubiertos 10 mg (Donepezilo Clorhidrato) 46
- Gabata Cápsulas 300 mg (Gabapentina) 46
- Gabata Cápsulas 400 mg (Gabapentina) 46
- Levera Comprimidos Recubiertos 500 mg (Levetiracetam) 47
- Levera Comprimidos Recubiertos 1000 mg (Levetiracetam) 47
- Nortium Comprimidos Recubiertos 25 mg (Quetiapina) 47
- Nortium Comprimidos Recubiertos 100 mg (Quetiapina) 47
- Nortium Comprimidos Recubiertos 200 mg (Quetiapina) 47

ÍNDICE

Sistema Nervioso

- Nortium XR Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 50 mg (Quetiapina)	48
- Nortium XR Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 150 mg (Quetiapina)	48
- Nortium XR Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 200 mg (Quetiapina)	48
- Nortium XR Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 300 mg (Quetiapina)	48
- Pentinor Capsulas 50 mg (Pregabalina)	48
- Pentinor Cápsulas 75 mg (Pregabalina)	48
- Pentinor Cápsulas 150 mg (Pregabalina)	48
- Prilan Comprimidos 10 mg (Aripiprazol)	49
- Prilan Comprimidos 15 mg (Aripiprazol)	49
- Rangar Comprimidos 1 mg (Rasagilina)	49
- Venlakem Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 37,5 mg (Venlafaxina)	50
- Venlakem Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 75 mg (Venlafaxina)	50
- Venlakem Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 150 mg (Venlafaxina)	50
- Vigakem Comprimidos Recubiertos 500 mg (Vigabatrina)	50

Quelantes

- Queferox Comprimidos Dispersables 500 mg (Deferasirox)	51
--	----

Urológicos

- Solicend Comprimidos Recubiertos 5 mg (Solifenacina)	52
--	----

ÍNDICE

GENÉRICOS

Alergias

- Cetirizina Diclorhidrato Comprimidos Recubiertos 10 mg	54
- Desloratadina Comprimidos Recubiertos 5 mg	54
- Hidrocortisona Crema Tópica 1%	54
- Levocetirizina Diclorhidrato Comprimidos Recubiertos 5 mg	55
- Loratadina Comprimidos 10 mg	55
- Mometasona Furoato Crema Tópica 0,1%	55

Analgésicos

- Celecoxib Cápsulas 200 mg	56
- Diclofenaco Dietilamina Gel Tópico 1,16 %	56
- Ibuprofeno Capsulas Blandas 400 mg	56
- Ibuprofeno Comprimidos Recubiertos 200 mg	56
- Ibuprofeno Comprimidos Recubiertos 400 mg	56
- Ibuprofeno Comprimidos Recubiertos 600 mg	56
- Ibuprofeno Suspensión Oral 100 mg/5 mL	57
- Ibuprofeno Suspensión Oral 200 mg/5 mL	57
- Ketoprofeno Gel Tópico 2,5%	57
- Tramadol Clorhidrato/Paracetamol Comprimidos Recubiertos 37,5/325 mg	57

Antídotos

- Sugammadex Solución Inyectable 200 mg/2 mL	58
--	----

Antiglaucomatosos

- Latanoprost Solución Oftálmica 50 mcg/mL	59
- Timolol Solución Oftálmica 0,5 %	59
- Travoprost Solución Oftálmica 0,004 %	59

Antiinfecciosos

- Aciclovir Crema Tópica 5 %	60
- Amoxicilina/Acido Clavulánico Comprimidos Recubiertos 500/125 mg	60
- Amoxicilina/Ácido Clavulánico Comprimidos Recubiertos 875/125 mg	60
- Azitromicina Comprimidos Recubiertos 500 mg	60
- Cefuroxima Comprimidos Recubiertos 500 mg	61
- Ciprofloxacino Comprimidos Recubiertos 500 mg	61
- Clotrimazol/Betametasona Crema Tópica 1/ 0,05%	62
- Clotrimazol Crema Tópica 1%	62
- Gentamicina Solución Oftálmica 0,3%	62
- Itraconazol Cápsulas 100 mg	63

ÍNDICE

Antiinfecciosos

- Ketoconazol Crema Tópica 2%	63
- Levofloxacin Comprimidos Recubiertos 500 mg	64
- Linezolid Comprimidos Recubiertos 600 mg	64
- Mupirocina Ungüento Tópico 2%	65
- Terbinafina Clorhidrato Crema Tópica 1%	65

Cardiovascular

- Acetazolamida Comprimidos 250 mg	66
- Amlodipino Comprimidos 5 mg	66
- Amlodipino Comprimidos 10 mg	66
- Betahistina Diclorhidrato Comprimidos 16 mg	67
- Betahistina Diclorhidrato Comprimidos 24 mg	67
- Bisoprolol Fumarato Comprimidos Recubiertos 1,25 mg	67
- Bisoprolol Fumarato Comprimidos Recubiertos 2,5 mg	67
- Bisoprolol Fumarato Comprimidos Recubiertos 5 mg	67
- Clopidogrel Comprimidos Recubiertos 75 mg	68
- Heparina Sódica Solución Inyectable 5.000 U.I./5 mL	69
- Heparina Sódica Solución Inyectable 25.000 U.I./5 mL	69
- Losartán Potásico Comprimidos Recubiertos 50 mg	69
- Losartan Potásico Comprimidos Recubiertos 100 mg	69
- Losartan Potásico/Hidroclorotiazida Comprimidos Recubiertos 50/12,5 mg	70
- Telmisartán Comprimidos 40 mg	70
- Telmisartán Comprimidos 80 mg	70

Corticoides

- Betametasona Crema Tópica 0,05%	71
- Clobetasol Propionato Crema Tópica 0,05 %	71

Gástrico

- Esomeprazol Cápsulas con Gránulos con Recubrimiento Entérico 20 mg	72
- Esomeprazol Cápsulas con Gránulos con Recubrimiento Entérico 40 mg	72
- Famotidina Comprimidos Recubiertos 20 mg	72
- Famotidina Comprimidos Recubiertos 40 mg	72

Inmunosupresores

- Azatioprina Comprimidos 50 mg	73
- Letrozol Comprimidos Recubiertos 2,5 mg	73
- Sirolimus Comprimidos Recubiertos 0,5 mg	74
- Sirolimus Comprimidos Recubiertos 1 mg	74

ÍNDICE

Metabólicos

- Atorvastatina Comprimidos Recubiertos 10 mg	75
- Atorvastatina Comprimidos Recubiertos 20 mg	75
- Atorvastatina Comprimidos Recubiertos 40 mg	75
- Atorvastatina Comprimidos Recubiertos 80 mg	75
- Cinacalcet Comprimidos Recubiertos 30 mg	76
- Ezetimiba/Simvastatina Comprimidos 10/10 mg	76
- Ezetimiba/Simvastatina Comprimidos 10/20 mg	76
- Metformina Clorhidrato Comprimidos de Liberación Prolongada 500 mg	77
- Metformina Clorhidrato Comprimidos de Liberación Prolongada 750 mg	77
- Metformina Clorhidrato Comprimidos de Liberación Prolongada 1000 mg	77
- Metformina Clorhidrato Comprimidos Recubiertos 850 mg	77
- Omeprazol Cápsulas con Gránulos con Recubrimiento Entérico 20 mg	78
- Pancreatina 10000 Cápsulas con Gránulos con Recubrimiento Entérico 150 mg	78
- Pancreatina 25000 Cápsulas con Gránulos con Recubrimiento Entérico 300 mg	78
- Rosuvastatina Comprimidos Recubiertos 10 mg	79
- Rosuvastatina Comprimidos Recubiertos 20 mg	79

Respiratorio

- Ambroxol Clorhidrato Jarabe 15 mg/5 mL	80
- Ambroxol Clorhidrato Jarabe 30 mg/5 mL	80
- Montelukast Comprimidos Recubiertos 10 mg	80

Salud femenina

- Levonorgestrel Comprimidos 1,5 mg	81
-------------------------------------	----

Salud masculina

- Tamsulosina Clorhidrato Cápsulas con Gránulos Recubiertos de Liberación Prolongada 0,4 mg	82
---	----

Sedantes

- Bromuro de Rocuronio Solución Inyectable 50 mg/5 mL	83
- Dexmedetomidina Solución Inyectable 200 mcg/2 mL	83

Sistema Nervioso

- Aripiprazol Comprimidos 10 mg	84
- Aripiprazol Comprimidos 15 mg	84
- Donepezilo Clorhidrato Comprimidos Recubiertos 10 mg	84
- Duloxetina Cápsulas con Gránulos con Recubrimiento Entérico 30 mg	84
- Duloxetina Cápsulas Con Gránulos con Recubrimiento Entérico 60 mg	84

Sistema Nervioso

- Escitalopram Comprimidos Recubiertos 10 mg	85
- Escitalopram Comprimidos Recubiertos 20 mg	85
- Gabapentina Cápsulas 300 mg	85
- Gabapentina Cápsulas 400 mg	85
- Levetiracetam Comprimidos Recubiertos 500 mg	86
- Levetiracetam Comprimidos Recubiertos 1000 mg	86
- Mirtazapina Comprimidos Recubiertos 15 mg	86
- Mirtazapina Comprimidos Recubiertos 30 mg	86
- Pregabalina Cápsulas 75 mg	87
- Pregabalina Cápsulas 150 mg	87
- Quetiapina Comprimidos Recubiertos 25 mg	87
- Quetiapina Comprimidos Recubiertos 100 mg	87
- Quetiapina Comprimidos Recubiertos 200 mg	87
- Quetiapina Comprimidos Recubiertos 300 mg	87
- Quetiapina Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 50 mg	88
- Quetiapina Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 150 mg	88
- Quetiapina Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 200 mg	88
- Quetiapina Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 300 mg	88
- Sertralina Comprimidos Recubiertos 100 mg	88
- Venlafaxina Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 37,5 mg	89
- Venlafaxina Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 75 mg	89
- Venlafaxina Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada 150 mg	89
- Zolpidem Tartrato Comprimidos Recubiertos 10 mg	89
- Zopiclona Comprimidos Recubiertos 7,5 mg	89



Marcas

Alfexa®



Nombre:

- ALFEXA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 120 mg (FEXOFENADINA CLORHIDRATO)
- ALFEXA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 180 mg (FEXOFENADINA CLORHIDRATO)

Principio Activo: Fexofenadina Clorhidrato

Grupo Terapéutico: Alergias

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones:

- **Rinitis Alérgica Estacional:** Para el alivio de los síntomas asociados con rinitis alérgica estacional, en adultos y niños desde los 12 años de edad. Los síntomas efectivamente tratados son: estornudos, rinorrea, picazón naso - palatina y/o de garganta, picazón / lagrimeo / enrojecimiento de los ojos y congestión nasal.
- **Urticaria Idiopática Crónica:** Para el tratamiento de manifestaciones cutáneas sin complicaciones debidas a urticaria crónica idiopática en adultos y niños desde los 12 años de edad. Reduce significativamente el prurito y el número de ronchas.

Composición: 120 mg; 180 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-26500; F-25129

Condición de Venta: Receta Simple

Bilakem®

Nombre: BILAKEM COMPRIMIDOS 20 mg (BILASTINA)

Principio Activo: BILASTINA

Grupo Terapéutico: Alergias

Presentación: 30 Comprimidos

Indicaciones: Tratamiento sintomático de la rino-conjuntivitis alérgica (estacional y perenne) y de la urticaria.

Composición: 20 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-27428

Condición de Venta: Receta Simple



Cetirex®

Nombre: CETIREX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg (CETIRIZINA DICLORHIDRATO)

Principio Activo: CETIRIZINA

Grupo Terapéutico: Alergias

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones:

- **Adultos y niños de 6 meses en adelante:** Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica perenne y tratamiento del prurito y de la urticaria idiopática crónica.
- **Adultos y niños de 2 años en adelante:** Tratamiento sintomático de la rinitis y de conjuntivitis estacionales.

Composición: 10 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-26058; F-23976

Condición de Venta: Receta Simple



Lezitar®

Principio Activo: Levocetirizina diclorhidrato

Grupo Terapéutico: Alergias

Presentación: 30 y 40 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Está indicado para:

- El alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica estacional en adultos y niños de 2 años y más;
- Alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica perenne en adultos y niños desde los 6 meses de edad;
- Tratamiento de manifestaciones cutáneas no complicadas relacionadas con la urticaria idiopática crónica en adultos y niños desde los 6 meses.

Composición: 5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-25073

Condición de Venta: Receta Simple



Olokem®



Nombre: OLOKEM SOLUCION OFTÁLMICA 0,2% (OLOPATADINA)

Principio Activo: OLOPATADINA CLORHIDRATO

Grupo Terapéutico: Alergias

Presentación: 1 frasco con 2,5 mL

Indicaciones: Indicado para la prevención y el tratamiento de la picazón ocular asociada con la conjuntivitis alérgica.

Composición: 0,2220 g

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Solución Oftálmica

Registro sanitario: F-27399

Condición de Venta: Receta Simple

Tamides®

Nombre: TAMIDES COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg (DESLORATADINA)

Principio Activo: DESLORATADINA

Grupo Terapéutico: Alergias

Presentación: 30 Comprimidos

Indicaciones: Desloratadina está indicada en adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad para el alivio de los síntomas asociados con:

- Rinitis alérgica.
- Urticaria

Composición: 5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-25942

Condición de Venta: Receta Simple



Tremecort®



Nombre: TREMECORT CREMA TÓPICA 0,1% (MOMETASONA FUROATO)

Principio Activo: MOMETASONA FUROATO

Grupo Terapéutico: Alergias

Presentación: 10 y 15 g

Indicaciones: Alivio de las manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis que responden a corticosteroides como psoriasis y dermatitis atópica.

Composición: 0,1%

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Crema tópica

Registro sanitario: F-24843

Condición de Venta: Receta Simple

Coxira®

Nombre: COXIRA CÁPSULAS 200 mg
Principio Activo: CELECOXIB
Grupo Terapéutico: Analgésicos
Presentación: 10 y 30 Cápsulas
Indicaciones: Tratamiento sintomático de la osteoartritis y de la artritis reumatoide. Alivio de los signos y síntomas de la espondilitis anquilosante. Manejo del dolor agudo. Tratamiento de la dismenorrea primaria.
Composición: 200 mg
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Cápsulas
Registro sanitario: F-23213; F-26350; F-27448
Condición de Venta: Receta Simple



Dolad®



Nombre: DOLAD SUSPENSIÓN ORAL 200 mg/5 mL
Principio Activo: Ibuprofeno
Grupo Terapéutico: Analgésicos
Presentación: 100 mL y 120 mL
Indicaciones: Alivio de procesos inflamatorios y dolorosos de tejidos blandos y músculo esqueléticos y para reducir la temperatura en cuadros febriles.
Composición: 200 mg/5 mL
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Suspensión Oral
Registro sanitario: F-27277
Condición de Venta: Directa

Kenatrum®

Nombre: KENATRUM 37,5/325 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Principio Activo: Tramadol clorhidrato/ Paracetamol
Grupo Terapéutico: Analgésicos
Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos
Indicaciones: Indicado en el manejo del dolor moderado a severo, agudo y crónico.
Composición: 37,5/325 mg
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos
Registro sanitario: F-26076
Condición de Venta: Receta Retenida



Brimokem®



Nombre: BRIMOKEM SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,2% (BRIMONIDINA)
Principio Activo: BRIMONIDINA
Grupo Terapéutico: Antiglaucomatosos
Presentación: 1 frasco con 5 mL
Indicaciones: Está indicado para disminuir la presión intraocular (PIO) en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular.
Composición: 0,2%
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Solución Oftálmica
Registro sanitario: F-25743
Condición de Venta: Receta Simple

Dorzox®

Nombre: DORZOX SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 % (DORZOLAMIDA CLORHIDRATO 20 Mg/mL)
Principio Activo: DORZOLAMIDA (CLORHIDRATO)
Grupo Terapéutico: Antiglaucomatosos
Presentación: 1 frasco con 5 mL
Indicaciones: Tratamiento de la presión intraocular elevada en pacientes con:
- Hipertensión ocular,
- Glaucoma de ángulo abierto,
- Glaucoma pseudoexfoliativo u otros glaucomas secundarios de ángulo abierto.
Composición: 2% (20 mg/mL)
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Solución Oftálmica
Registro sanitario: F-24570
Condición de Venta: Receta Simple



Dorzox T®



Nombre: DORZOX T SOLUCIÓN OFTÁLMICA
Principio Activo: Dorzolamida (clorhidrato)/ Timolol (como maleato)
Grupo Terapéutico: Antiglaucomatosos
Presentación: 1 frasco con 5 mL
Indicaciones: Tratamiento de la presión intraocular (pio) elevada en pacientes con hipertensión ocular, glaucoma de ángulo abierto, glaucoma pseudoexfoliativo u otros glaucomas secundarios de ángulo abierto cuando la terapia concomitante es apropiada. Uso en niños a partir de los 2 años edad.
Composición: 22.26/6,83 mg/mL
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Solución Oftálmica
Registro sanitario: F-24559
Condición de Venta: Receta Simple

Azithral®

Nombre: AZITHRAL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500 mg
Principio Activo: AZITROMICINA
Grupo Terapéutico: Sistema nervioso
Presentación: 3 y 6 Comprimidos Recubiertos
Indicaciones: Azitromicina está indicada para infecciones causadas por organismos susceptibles, infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo bronquitis y neumonía; en infecciones de la piel y tejidos blandos; en otitis media aguda y en infecciones del tracto respiratorio superior, incluyendo sinusitis y faringitis/amigdalitis. Tratamiento de infecciones genitales no complicadas, en hombres y mujeres, debido a *Chlamydia trachomatis*. También está indicada en el tratamiento del chancro blando debido a *Haemophilus ducreyi* y en la infección genital no complicada debida a *Neisseria gonorrhoea* no multiresistente. Se debe excluir la infección concomitante con *Treponema pallidum*.
Composición: 500 mg
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos
Registro sanitario: F-22563
Condición de Venta: Receta Simple




Bectaclem®



Nombre: BECTACLEM CREMA TÓPICA
Principio Activo: BETAMETASONA//CLOTRIMAZOL
Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos
Presentación: 15 g
Indicaciones: Clotrimazol/Betametasona crema tópica se recomienda como tratamiento tópico las siguientes infecciones dérmicas: Tiña pedis, tiña cruris y tiña corporis, debida a *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum* y *Microsporium canis*. También en candidiasis vulvovaginal.
Composición: 1%/0.05%
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Crema Tópica
Registro sanitario: F-27702
Condición de Venta: Receta Simple

Ciprosceid®

Nombre: CIPROSCEND SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3% (CIPROFLOXACINO)
Principio Activo: CIPROFLOXACINO
Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos
Presentación: 1 frasco con 5 mL
Indicaciones: Tratamiento de conjuntivitis bacterianas, blefaritis (inflamación de párpados), blefaroconjuntivitis (inflamación de párpados y conjuntiva) y úlcera corneal (queratitis) causadas por cepas susceptibles.
Composición: 0,3%
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Solución Oftálmica
Registro sanitario: F-27267
Condición de Venta: Receta Retenida



Cleomycin®



Nombre: CLEOMYCIN GEL TÓPICO 1% (CLINDAMICINA)

Principio Activo: CLINDAMICINA

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 30 g

Indicaciones: Tratamiento del Acné Vulgaris, actúa sobre *Stafilococcus coagulasa positivos* y negativos, incluyendo los productos de penicilinasas. *Streptococos* de los grupos Alfa y Beta hemolíticos.

Composición: 1%

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Gel Tópico

Registro sanitario: F-27213

Condición de Venta: Receta Simple

Flukem®

Nombre: FLUKEM CÁPSULAS 75 mg (OSELTAMIVIR)

Principio Activo: Osetamivir

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 10 Cápsulas

Indicaciones: Está indicado para el tratamiento de la gripe en adultos y niños a partir de 1 año de edad. Sólo está indicado en niños mayores de 6 meses de edad durante un brote pandémico de gripe.

Composición: 75 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas

Registro sanitario: F-27447

Condición de Venta: Receta Retenida



Impracid®



Nombre: IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

Principio Activo: Cilastatina sódica/ Imipenem monohidrato

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 1 vial con polvo para solución inyectable

Indicaciones: Tratamiento de infecciones por gérmenes sensibles a su acción. Tratamiento de infecciones mixtas por cepas sensibles de bacterias aerobias y anaerobias. Prevención de ciertas infecciones postoperatorias cuando hay o puede haber contaminación durante el procedimiento quirúrgico o cuando una infección postoperatoria podría ser especialmente grave.

Composición: 500/500 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Polvo para solución inyectable

Registro sanitario: F-24785

Condición de Venta: Receta Simple

Moxivulan®

Nombre: MOXIVULAN 875/125 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Principio Activo: ÁCIDO CLAVULÁNICO/AMOXICILINA
Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos
Presentación: 14 y 20 unidades por estuche
Indicaciones: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, tracto urinario, de piel y tejidos blandos, sepsis intraabdominal, osteomielitis, producidas por microorganismos sensibles y productores de beta lactamasas demostrado por antibiograma.
Composición: 875/125 mg
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos
Registro sanitario: F-25244
Condición de Venta: Receta Simple



Pluricef®



Nombre: PLURICEF COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg (CEFPODOXIMA)
Principio Activo: CEFPODOXIMA
Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos
Presentación: 10 y 20 unidades por estuche
Indicaciones: Indicada para el tratamiento oral de infecciones del tracto respiratorio provocadas por microorganismos susceptibles.
- Exacerbaciones agudas de bronquitis crónica.
- Neumonía adquirida de la comunidad.
- Sinusitis maxilar aguda.
- Otitis media aguda.
- Faringitis y tonsilitis causadas por estreptococo piogenes.
Se indica también en infecciones por microorganismos susceptibles en:
- Gonorrea no complicada.
- Infecciones no complicadas de la piel o estructuras de la piel.
- Infecciones no complicadas del tracto urinario.
Composición: 200 mg
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos
Registro sanitario: F-24849
Condición de Venta: Receta Retenida

Premoxin®

Nombre: PREMOXIN SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5% (MOXIFLOXACINO)
Principio Activo: MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO
Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos
Presentación: 1 frasco con 5 mL
Indicaciones: Tratamiento de la conjuntivitis bacteriana causada por cepas sensibles de microorganismos.
Composición: 0,545 mg
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Solución Oftálmica
Registro sanitario: F-25812
Condición de Venta: Receta Simple



Viprovir®



Nombre: VIPROVIR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500 mg (VALACICLOVIR)

Principio Activo: VALACICLOVIR

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 10 y 42 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Indicado para el tratamiento de herpes zoster agudo localizado en adultos inmunocompetentes. Indicado para el tratamiento de episodios iniciales y recurrentes de Herpes Genital en adultos inmunocompetentes. Indicado para la supresión crónica de episodios recurrentes de herpes genital en individuos inmunocompetentes. Para disminuir el riesgo de transmisión de herpes genital a pareja heterosexual susceptible, en combinación con prácticas sexuales más seguras. Indicado para la profilaxia de infección y enfermedad por citomegalovirus (CMV) tras trasplante de órgano. Indicado para tratar herpes labial.

Composición: 500 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-24637

Condición de Venta: Receta Simple

Amlipros®

Nombre:

- AMLIPROS 5/40 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS;
- AMLIPROS 10/40 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Principio Activo: AMLODIPINO//OLMESARTAN MEDOXOMILO

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la hipertensión, solo o en combinación con otros agentes antihipertensivos. Esta combinación no está indicada como terapia inicial de la hipertensión.

Composición: 5/40 mg; 10/40 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-23219; F-24519

Condición de Venta: Receta Simple



Biprosel®

Nombre:

- BIPOSEL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1,25 mg (BISOPROLOL FUMARATO)
- BIPOSEL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2,5 mg (BISOPROLOL FUMARATO)
- BIPOSEL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg (BISOPROLOL FUMARATO)

Principio Activo: BISOPROLOL FUMARATO

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la cardiopatía coronaria. Tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica estable, en combinación con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) y diuréticos, y de manera opcional con glucósidos cardiacos.

Composición: 1,25 mg; 2,5 mg; 5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-25175; F-25210; F-28219; F-28220; F-25117

Condición de Venta: Receta Simple



Clopiquem®



Nombre: CLOPIKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 75 mg [Clopidogrel]

Principio Activo: CLOPIDOGREL

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Clopidogrel está indicado para la reducción de los siguientes eventos aterotrombóticos en:

- Infarto de Miocardio reciente (IM), accidente cerebrovascular isquémico reciente o enfermedad arterial periférica establecida: En los pacientes con historia de infarto de miocardio (IM) e infarto cerebral recientes o enfermedad arterial periférica establecida, clopidogrel ha demostrado que reduce la tasa de un parámetro combinado de nuevo infarto cerebral isquémico (fatal o no), nuevo IM (fatal o no) y otras muertes vasculares.
- Síndrome coronario agudo:
 - Pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q), incluyendo a pacientes que han estado manejados médicamente y aquellos que han sido manejados con una intervención coronaria percutánea (con o sin stent) o cirugía de bypass arterial coronario. Clopidogrel ha demostrado que reduce la tasa de un parámetro combinado de muerte cardiovascular, IM, accidente cerebrovascular o isquemia refractaria.
 - Pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, en combinación con ácido acetil salicílico (AAS) en pacientes tratados médicamente, elegibles para terapia trombolítica. En pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, se ha demostrado que clopidogrel disminuye la tasa de muerte por cualquier causa y la tasa de eventos finales combinados de muerte, re-infarto.

Clopidogrel está indicado en adultos para la prevención de eventos aterotrombóticos y tromboembólicos en:

- Fibrilación auricular:
 - En pacientes con fibrilación auricular (FA) con riesgo aumentado de eventos cardiovasculares que pueden recibir terapia antagonista de la vitamina K (VKA). La terapia VKA ha demostrado estar asociada con mejores beneficios clínicos que el ácido acetil salicílico (AAS) solo o con la combinación de clopidogrel con AAS para la reducción de accidentes cerebrovasculares.
 - En pacientes con fibrilación auricular (FA) que tienen al menos un factor de riesgo para eventos cardiovasculares y que no pueden recibir terapia VKA (por ejemplo, riesgo específico de sangrado, evaluación médica de que el paciente no es capaz de cumplir con el monitoreo del Rango Internacional Normalizado (INR, por sus siglas en inglés), o que el uso de VKA no es apropiado). Clopidogrel está indicado en combinación con AAS para la prevención de eventos aterotrombóticos y tromboembólicos, inclusive accidente cerebrovascular. Clopidogrel en combinación con AAS ha demostrado reducir la tasa del resultado final combinado para accidente cerebrovascular, infarto de miocardio (IM), embolismo sistémico no-SNC (no del sistema nervioso central) o muerte vascular, principalmente por la reducción de accidente cerebrovascular.

Composición: 75 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-25051

Condición de Venta: Receta Simple

Clotakem®



Nombre: CLOTAKEM COMPRIMIDOS 50 mg (CLORTALIDONA)

Principio Activo: CLORTALIDONA

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos

Indicaciones: Terapia en la hipertensión esencial, como monodroga o asociado a otros agentes.

Composición: 50 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-25673

Condición de Venta: Receta Simple

Dabitrom®

Nombre:

- DABITROM CÁPSULAS 75 mg
- DABITROM CÁPSULAS 150 mg (DABIGATRÁN ETEXILATO)

Principio Activo: DABIGATRÁN ETEXILATO MESILATO

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 y 60 Cápsulas

Indicaciones: Prevención primaria de episodios tromboembólicos venosos en pacientes adultos con insuficiencia renal moderada sometidos a cirugía de reemplazo total de cadera o cirugía de reemplazo total de rodilla, programada en ambos casos.

- Para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) y embolismo sistémico en pacientes con fibrilación auricular no valvular.

- Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y/o la embolia pulmonar (EP) aguda y prevención de la muerte relacionada.

- Prevención de la trombosis venosa profunda (TVP) y/o la embolia pulmonar (EP) recurrente y la muerte relacionada.

Composición: 75 mg; 150 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas

Registro sanitario: F-22737; F-22738

Condición de Venta: Receta Simple



Irkem®

Nombre:

- IRKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 150 mg (IRBESARTÁN)
- IRKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 300 mg (IRBESARTÁN)

Principio Activo: Irbesartán

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 28 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Irbesartán está indicado en adultos para el tratamiento de la hipertensión esencial. También está indicado para el tratamiento de la nefropatía en pacientes adultos con diabetes tipo 2 e hipertensión como parte de su tratamiento antihipertensivo.

Composición: 150 mg; 300 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-27158; F-27159

Condición de Venta: Receta Simple



Meprokem®



Nombre:

- MEPROKEM COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 25 mg (METOPROLOL TARTRATO)
- MEPROKEM COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 50 mg (METOPROLOL TARTRATO)

Principio Activo: METOPROLOL SUCCINATO

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos de liberación prolongada

Indicaciones: Hipertensión: para reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de morbi-mortalidad cardiovascular y coronaria (lo cual incluye la muerte súbita). Angina de pecho. Insuficiencia cardíaca crónica, sintomática y estable con disfunción ventricular izquierda sistólica, como complemento de otras terapias para la insuficiencia cardíaca, aumentar la supervivencia, reducir la hospitalización, mejorar la función ventricular

izquierda, mejorar la clase funcional de la NYHA y mejorar la calidad de vida. Prevención de la muerte de origen cardíaco y del reinfarcto tras la fase aguda del infarto de miocardio. Arritmias cardíacas, en particular taquicardia supra ventricular, reducción de ritmo ventricular en la fibrilación auricular y en caso de extrasístoles ventriculares. Palpitaciones provocadas por trastornos de la función cardíaca. Profilaxis de la migraña.

Composición: 25 mg; 50 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación prolongada

Registro sanitario: F-25710; F-25711

Condición de Venta: Receta Simple

Olmepress®

Nombre:

- OLMEPRESS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 mg
- OLMEPRESS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 mg

Principio Activo: OLMESARTÁN MEDOXOMILO

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la hipertensión. Puede ser utilizado como droga única o en combinación con otros medicamentos antihipertensivos.

Composición: 20 mg; 40 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-22760; F-22759

Condición de Venta: Receta Simple



Olmepress D®

Nombre:

- OLMEPRESS D 20/12,5 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
- OLMEPRESS D 40/12,5 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Principio Activo: HIDROCLOROTIAZIDA/OLMESARTÁN MEDOXOMILO

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 y 40 Comprimidos recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la hipertensión cuando la monoterapia con olmesartán medoxomilo o hidroclorotiazida, por sí solos, no son suficientes para controlar adecuadamente la presión arterial.

Composición: 20/12,5 mg; 40/12,5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos

Registro sanitario: F-22092; F-22094

Condición de Venta: Receta Simple



Texinal®

Nombre:

- TEXINAL COMPRIMIDOS 40 mg (TELMISARTAN)
- TEXINAL COMPRIMIDOS 80 mg (TELMISARTAN)

Principio Activo: TELMISARTAN

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos

Indicaciones: Tratamiento de hipertensión esencial. Prevención de la movilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes de 55 años de edad y más, con alto riesgo de enfermedad cardiovascular.

Composición: 40 mg; 80 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-23082; F-23081

Condición de Venta: Receta Simple



Valkem®



Nombre:

- VALKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 80 mg (VALSARTÁN)
- VALKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 160 mg (VALSARTÁN)

Principio Activo: VALSARTÁN

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Hipertensión arterial. Tratamiento de la hipertensión.

- Tratamiento de la insuficiencia cardiaca (clase II-IV de la NYHA) en adultos que reciben tratamientos habituales con diuréticos, digitálicos y, o bien inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), o bien betabloqueadores, pero no ambos. No es obligatorio que el paciente esté recibiendo todos estos tratamientos habituales.
- Pacientes que han sufrido un infarto del miocardio. Está indicado para mejorar la supervivencia después de un infarto de miocardio en adultos con un estado clínico estable, pero con signos, síntomas o hallazgos radiológicos de insuficiencia ventricular izquierda o con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.

Composición: 80 mg; 160 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-25162; F-25161

Condición de Venta: Receta Simple

Valkem D®

Nombre:

- VALKEM D 80/12,5 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
- VALKEM D 160/12,5 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
- VALKEM D 160/25 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Principio Activo: VALSARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la hipertensión arterial en adultos mayores de 18 años. Valkem D está indicado para el tratamiento de la hipertensión cuando no se ha logrado un control satisfactorio de la tensión arterial con la monoterapia.

Composición: 80/12,5 mg; 160/12,5 mg; 160/25 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-25160; F-25157; F-25159

Condición de Venta: Receta Simple



Valmira®



Nombre:

- VALMIRA 5/80 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
- VALMIRA 5/160 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
- VALMIRA 10/160 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Principio Activo: AMLODIPINO//VALSARTÁN

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 28 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones:

- Indicado para pacientes cuya presión arterial no se controla adecuadamente con amlodipino o valsartán en monoterapia.
- Tratamiento para la hipertensión esencial. Puede ser usado en aquellos pacientes cuya presión arterial no esté adecuadamente controlada con monoterapia. También puede ser usado como terapia inicial en aquellos pacientes que probablemente necesiten de varios medicamentos para alcanzar un control adecuado de su presión arterial.

Composición: 5/80 mg; 15/60 mg; 10/160 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-25705; F-25706; F-25707

Condición de Venta: Receta Simple

Zotaban®

Nombre:

- ZOTABAN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg (Rivaroxabán)
- ZOTABAN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 15 mg (Rivaroxabán)
- ZOTABAN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 mg (Rivaroxabán)

Principio Activo: RIVAROXABÁN

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 28 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Está indicado para la prevención del tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes sometidos a una intervención quirúrgica ortopédica mayor de las extremidades inferiores. Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar (PE), y la prevención de la TVP recurrente y la EP en adultos.

RIVAROXABÁN está indicado para la prevención de accidente cerebrovascular y embolismo sistémico en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular con uno más factores de riesgo, tales como falla cardíaca congestiva, hipertensión, edad, 75 años, diabetes mellitus, accidente cerebrovascular previo o accidente isquémico transitorio. RIVAROXABÁN está indicado para el tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y embolismo pulmonar (EP), y para la prevención de la TVP y el embolismo pulmonar (EP) recurrentes. Población pediátrica: RIVAROXABÁN está indicado para el tratamiento del tromboembolismo venoso (TEV) y la prevención de la recidiva del TEV en niños y adolescentes menores de 18 años con un peso superior a 30 kg después de la iniciación del tratamiento anticoagulante estándar.

Composición: 10 mg; 15 mg; 20 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-28095; F-28096; F-28097

Condición de Venta: Receta Simple



Esoflux®



Nombre:

- ESOFLEX CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 20 mg (ESOMEPRAZOL)
- ESOFLEX CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 40 mg (ESOMEPRAZOL)

Principio Activo: Esomeprazol magnésico trihidrato

Grupo Terapéutico: Gástrico

Presentación: 30 Cápsulas con gránulos con recubrimiento entérico

Indicaciones:

Enfermedad por reflujo gastroesofágico [ERGE]:

- Tratamiento de la esofagitis por reflujo erosiva;
- Tratamiento preventivo a largo plazo de pacientes con esofagitis cicatrizada para evitar recaídas;
- Tratamiento sintomático de la enfermedad por reflujo gastroesofágico [ERGE].;
- Uso en adolescentes desde 12 años en el tratamiento a corto plazo de reflujo gastroesofágico.

En pacientes que necesitan de un tratamiento continuo con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs):

- Indicado en pacientes mayores de 18 años en riesgo de desarrollar úlcera gástrica por AINEs. Se consideran pacientes en riesgo a mayores de 60 años y/o con antecedentes documentados de úlcera gástrica,

Nota: los estudios controlados no se extienden más allá de 6 meses.

En pacientes que necesitan de un tratamiento continuo de Ácido Acetilsalicílico en dosis bajas (75-325mg):

- Para la prevención de úlceras gástricas y/o duodenales asociadas con el tratamiento con Ácido Acetilsalicílico en dosis bajas en pacientes en riesgo. A continuación del tratamiento con Esomeprazol IV para la mantención de la hemostasia y prevención de recidivas hemorrágicas de úlceras gástricas y duodenales. En combinación con un régimen terapéutico antibacteriano adecuado para erradicar el *Helicobacter pylori* para la cicatrización de la úlcera duodenal asociado a *Helicobacter pylori* y para la prevención de recaídas de úlceras pépticas asociadas a *Helicobacter pylori*. Tratamiento del Síndrome de Zollinger-Ellison.

Composición: 20 mg; 40 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas con gránulos con recubrimiento entérico

Registro sanitario: F-25985; F-25984

Condición de Venta: Receta Simple

Librin-C®

Nombre: LIBRIN-C 5/2,5 CÁPSULAS

Principio Activo: Clordiazepóxido clorhidrato/Bromuro de clidinio

Grupo Terapéutico: Gástrico

Presentación: 30 Cápsulas

Indicaciones: Alivio sintomático de espasmos de origen gástrico y genitourinario en pacientes ansiosos.

Composición: 5/2,5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas

Registro sanitario: F-26470

Condición de Venta: Receta Simple



Buxend®



Nombre: BUXEND COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 mg (FEBUXOSTAT)

Principio Activo: FEBUXOSTAT

Grupo Terapéutico: Hiperuricemia

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la hiperuricemia crónica en pacientes con gota, en situaciones en las que ya se ha producido deposición de urato (incluyendo antecedentes o presencia de tofos y/o artritis gotosa).

Composición: 40 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-25121

Condición de Venta: Receta Simple

Colkem®

Nombre: COLKEM COMPRIMIDOS 0,5 mg (COLCHICINA)

Principio Activo: COLCHICINA

Grupo Terapéutico: Gástrico

Indicaciones: Tratamiento de ataque agudo de gota y profilaxis de ataques recurrentes.

Composición: 0,5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-28580

Condición de Venta: Receta Simple



Crolim®



Nombre:

- CROLIM CÁPSULAS 0,5 mg
- CROLIM CÁPSULAS 1 mg (TACROLIMUS)
- CROLIM CÁPSULAS 5 mg

Principio Activo: TACROLIMUS

Grupo Terapéutico: Inmunosupresores

Presentación: 10; 30; 50; 60 y 100 Cápsulas

Indicaciones: Profilaxis del rechazo de órganos en pacientes recibiendo trasplante renal o hepático alogénico. Se recomienda que Tacrolimus sea usado concomitantemente con corticoides.

Composición: 0,5 mg; 1 mg; 5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas

Registro sanitario: F-22506; F-22507; F-22391

Condición de Venta: Receta Simple

Eminod®

Nombre: EMINOD CÁPSULAS 0,5 mg

Principio Activo: Fingolimod Clorhidrato

Grupo Terapéutico: Inmunosupresores

Presentación: 30 Cápsulas

Indicaciones: Está indicado en el tratamiento de pacientes con formas recidivantes de esclerosis múltiple (EM), para reducir la frecuencia de las exacerbaciones clínicas y retrasar la progresión de la discapacidad física.

Composición: 0,5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas

Registro sanitario: F-22982

Condición de Venta: Receta Simple



Evescend®

Nombre:

- EVESCEND COMPRIMIDOS c (EVEROLIMUS)
- EVESCEND COMPRIMIDOS 0,5 mg (EVEROLIMUS)
- EVESCEND COMPRIMIDOS 0,75 mg (EVEROLIMUS)

Principio Activo: Everolimus

Grupo Terapéutico: Inmunosupresores

Presentación: 60 Comprimidos

Indicaciones:

- **Trasplante renal o cardíaco:** Everolimus está indicado para la profilaxis del rechazo de órgano en los pacientes adultos con riesgo inmunitario leve a moderado que reciben un alotrasplante renal o cardíaco. En el trasplante renal o cardíaco, Everolimus debe utilizarse junto con ciclosporina para microemulsión y corticoesteroides.
- **Trasplante hepático:** Everolimus está indicado para la profilaxis del rechazo de órgano en los pacientes adultos que reciben un trasplante hepático. En el trasplante hepático, Everolimus debe utilizarse junto con tacrolimus y corticoesteroides.


Composición: 0,25 mg; 0,5 mg; 0,75 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-26140; F-26138; F-26039

Condición de Venta: Receta Simple



Inmufen®

Nombre:

- INMUFEN CÁPSULAS 250 mg
- INMUFEN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500 mg

Principio Activo: Micofenolato mofetilo

Grupo Terapéutico: Inmunosupresores

Presentación: 30 Cápsulas (250 mg); 50 Comprimidos Recubiertos (500 mg)

Indicaciones: Indicado para la profilaxis del rechazo de órganos en pacientes que sufren trasplantes alogénico-renales, cardíacos o hepáticos. El Micofenolato mofetilo debe ser administrado conjuntamente con ciclosporina y corticosteroides.

Composición: 250 mg; 500 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas (250 mg); Comprimidos Recubiertos (500 mg)

Registro sanitario: F-20109; F-19749

Condición de Venta: Receta Simple



Panimun Bioral®

Nombre:

- PANIMUN BIORAL CÁPSULAS BLANDAS 25 mg
- PANIMUN BIORAL CÁPSULAS BLANDAS 100 mg

Principio Activo: CICLOSPORINA

Grupo Terapéutico: Inmunosupresor

Presentación: 30 Cápsulas blandas

Indicaciones:

- **Trasplante de órgano sólido:** Prevención del rechazo del injerto después de un alotrasplante de riñón, hígado, corazón, corazón-pulmón combinado, pulmón o páncreas. Tratamiento del rechazo del injerto en pacientes que anteriormente recibían otros inmunodepresores.
- **Trasplante de médula ósea:** Prevención del rechazo del injerto después de un trasplante de medula ósea. Prevención o tratamiento de la enfermedad injerto contra huésped (EICH).
- **Otras indicaciones distintas del trasplante:** Síndrome nefrítico: Síndrome nefrítico corticodependiente o corticorresistente en adultos y niños, causado por enfermedades glomerulares tales como nefropatía de cambios mínimos, glomeruloesclerosis focal o segmentaria, o glomerulonefritis membranosa. Puede emplearse tanto para inducir remisiones como para mantenerlas. También puede emplearse para mantener la remisión inducida con corticosteroides y poder suspender la administración de estos últimos.
- **Artritis reumatoide:** Tratamiento de la artritis reumatoide activa grave y activa, cuando los antirreumáticos tradicionales de acción lenta son inadecuados o ineficaces.
- **Psoriasis:** Tratamiento de la psoriasis grave cuando el tratamiento convencional es inadecuado o ineficaz.

Composición: 25 mg; 100 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas blandas

Registro sanitario: F-26579; F-26644

Condición de Venta: Receta Simple



Forlip®

Nombre:

- FORLIP COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg (ROSUVASTATINA)
- FORLIP COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 mg (ROSUVASTATINA)

Principio Activo: Rosuvastatina

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Forlip debe ser usado como un adyuvante a la dieta cuando la respuesta a la dieta y el ejercicio no es suficiente. Prevención de enfermedad cardiovascular primaria: para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, reducir el riesgo de infarto al miocardio y reducir el riesgo de procedimientos de revascularización en personas sin enfermedad coronaria evidente pero con un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular, basado en edad 50 años en hombres y 60 años en mujeres, HSPCR 2 mg/L y la presencia de al menos un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular como hipertensión, HDL-C bajo, fumar o historia familiar de enfermedad coronaria prematura. Pacientes con hiperlipidemia primaria y dislipidemia mixta para reducir los niveles totales de colesterol, LDL-C, Apo B, Colesterol no HDL y triglicéridos y para aumentar el HDL-C. Pacientes con hipertrigliceridemia. Pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica, para reducir los niveles de LDL-C, Colesterol total y Apo B. Detener la progresión de la aterosclerosis como parte de la estrategia de reducir los niveles de C total y LDL-C. También está indicado como adyuvante a la dieta para el tratamiento de pacientes con disbetalipoproteinemia primaria (hiperlipoproteinemia Fredrickson Tipo III). Niños y adolescentes de 10 a 17 años de edad con hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HeFH): En conjunto con la dieta para reducir los niveles de Colesterol total, LDL-C y Apo B en niños y niñas adolescentes cuya menarquia ocurrió al menos un año atrás, de 10 a 17 años de edad con hipercolesterolemia familiar heterocigótica si luego de un adecuado tratamiento con dieta están presentes los siguientes hallazgos: LDL-C > 190 mg/dL o 160 mg/dL y antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura (ECV) o dos o más factores de riesgo de ECV.

Composición: 10 mg; 20 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-24462; F-24463

Condición de Venta: Receta Simple



Glikem®



Nombre: GLIKEM COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 60 mg (GLICLAZIDA)

Principio Activo: Gliclazida

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 30 Comprimidos de Liberación Prolongada

Indicaciones: Diabetes no insulino-dependiente (tipo II), en el adulto, cuando el régimen alimenticio, el ejercicio físico y la reducción ponderal solas no son suficientes para restablecer el equilibrio glicémico.

Composición: 60 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos de Liberación Prolongada

Registro sanitario: F-25911

Condición de Venta: Receta Simple

Glimefor®

Nombre:

- GLIMEFOR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 850 mg
- Glimefor Comprimidos Recubiertos 1000 mg

Principio Activo: Metformina Clorhidrato

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 30 y 60 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la diabetes mellitus Tipo II, especialmente en pacientes cuya hiperglicemia no puede ser controlada solo con dieta, ejercicio o reducción de peso, o cuando la terapia insulínica no se necesita o no es practicable. Se usa como monoterapia o en combinación con sulfonilureas en pacientes adultos y niños mayores de 10 años, con diabetes tipo II cuando con éstas no se alcanza un adecuado control de la glicemia. Como coadyuvante en terapia insulínica en pacientes tipo I: diabetes inestable, diabetes insulinoresistente.

Composición: 850 mg; 1000 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-23097; F-23018

Condición de Venta: Receta Simple



Glimefor XR®

Nombre:

- GLIMEFOR XR 500 mg
- GLIMEFOR XR COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 750 mg
- GLIMEFOR XR 1000 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA

Principio Activo: Metformina Clorhidrato

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 30 y 60 Comprimidos de Liberación Prolongada

Indicaciones: Como monoterapia está indicado en conjunto con la dieta y el ejercicio, para mejorar el control glicémico en adultos con diabetes tipo II. Puede utilizarse concomitantemente con una sulfonilurea o insulina para mejorar el control glicémico en adultos. Prevención de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con prediabetes y con al menos un factor de riesgo adicional en los cuales las modificaciones de estilo de vida por sí solos no han logrado alcanzar un control adecuado de la glicemia.

Composición: 500 mg; 750 mg; 1000 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos de Liberación Prolongada

Registro sanitario: F-23720; F-23889; F-25856

Condición de Venta: Receta Simple



Glimekem®

Nombre: GLIMEKEM COMPRIMIDOS 4 mg

Principio Activo: Glimepirida

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 30 Comprimidos

Indicaciones: Tratamiento de la diabetes mellitus no insulino dependiente (tipo 2), cuando la dieta, el ejercicio físico y la reducción de peso por sí solos no son adecuados para controlar los niveles de glucosa en la sangre. También está indicado para uso en combinación con insulina para bajar los niveles de glucosa en pacientes cuya hiperglicemia no pueda ser controlada con dieta, ejercicio e hipoglicemiantes orales.

Composición: 4 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-25541

Condición de Venta: Receta Simple



Sitakem®

Nombre:

- SITAKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 50 mg (SITAGLIPTINA)
- SITAKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 mg (SITAGLIPTINA)

Principio Activo: SITAGLIPTINA CLORHIDRATO MONOHIDRATO

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 28 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Monoterapia y tratamiento combinado. Sitakem está indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glicémico en los adultos que padecen diabetes mellitus tipo 2.

Composición: 50 mg; 100 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-27292; F-27293

Condición de Venta: Receta Simple



Sitakem-M®

Nombre:

- SITAKEM - M 50/500 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
- SITAKEM - M 50/1000 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Principio Activo: SITAGLIPTINA FOSFATO / METFORMINA CLORHIDRATO

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Indicaciones: Está indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glicémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 cuando el tratamiento con metformina o sitagliptina sea apropiado. Importantes limitaciones de uso: No debe ser utilizado por pacientes con diabetes tipo 1 o para el tratamiento de cetoacidosis diabética.

Composición: 50/500 mg; 50/1000 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-27295; F-27294

Condición de Venta: Receta Simple



Sitakem-M XR®

Nombre:

- SITAKEM-M XR 50/500 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA
- SITAKEM-M XR 50/1000 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA
- SITAKEM-M XR 100/1000 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA

Principio Activo: SITAGLIPTINA FOSFATO / METFORMINA CLORHIDRATO

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Indicaciones: Está indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glicémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 cuando el tratamiento con metformina o sitagliptina sea apropiado. Importantes limitaciones de uso: No debe ser utilizado por pacientes con diabetes tipo 1 o para el tratamiento de cetoacidosis diabética.

Composición: 50/500 mg; 50/1000 mg; 100/1000 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada

Registro sanitario: F-27307; F-27308; F-27309

Condición de Venta: Receta Simple



Toresta®

**Nombre:**

- TORESTA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 mg (ATORVASTATINA)
- TORESTA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 80 mg (ATORVASTATINA)

Principio Activo: ATORVASTATINA**Grupo Terapéutico:** Metabólicos**Presentación:** 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Atorvastatina está indicada como adyuvante de la dieta para el tratamiento de pacientes con niveles elevados de colesterol total, LDL-colesterol, apolipoproteína B, y triglicéridos y para incrementar los niveles de HD-colesterol en pacientes con hipercolesterolemia primaria (hipercolesterolemia familiar heterocigota y no familiar), hiperlipidemia combinada (mixta) (Fredrickson Tipo IIa y IIb), niveles elevados de triglicéridos séricos (Fredrickson Tipo IV), y para pacientes con disbetalipoproteinemia (Fredrickson tipo III) que no responden adecuadamente a una dieta. Atorvastatina también está indicada para la reducción de colesterol total y LDL-colesterol en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, cuando la respuesta a la dieta y otras medidas no farmacológicas son inadecuadas. Tratamiento a pacientes hipertensos con colesterol total normal o moderadamente elevado (menor a 250 mg/dL) y que tiene asociados al menos otros tres factores de riesgo cardiovascular clásico para:

- Reducir el riesgo de enfermedad coronaria cardíaca fatal e infarto al miocardio no fatal.
- Reducir el riesgo de procedimientos de revascularización y angina pectoris. En pacientes con evidencia clínica de enfermedad coronaria cardíaca,

Atorvastatina está indicada para: Reducir el riesgo de infarto al miocardio no fatal, Reducir el riesgo de accidente vascular encefálico fatal y no fatal, Reducir el riesgo de procedimientos de revascularización Reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Reducir el riesgo de angina. En pacientes pediátricos de 10 a 17 años, atorvastatina está indicada como adyuvante de la dieta para reducir los niveles de C-total, LDL-C y apo B en niños y niñas posmenárrquicas con hipercolesterolemia familiar heterocigota si después de un estudio adecuado de la terapia con dieta, se encuentran presentes los siguientes hallazgos: a).- LDL-C sigue siendo 190 mg/dL o b).- LDL-C sigue siendo 160 mg/dL, y,

1.- existe un antecedente familiar positivo de enfermedad cardiovascular prematura, u

2.- otros dos o más factores de riesgo CVD están presentes en el paciente pediátrico Atorvastatina también está indicada en pacientes con diabetes tipo II sin evidencia de enfermedad coronaria cardíaca, pero con múltiples factores de riesgo por enfermedad coronaria cardíaca, tales como retinopatía, albuminuria, fumador o hipertensión, para :

1.- reducir el riesgo de infarto de miocardio, y

2.- reducir el riesgo de apoplejía o accidente vascular encefálico

Composición: 40 mg; 80 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-24010; F-24269

Condición de Venta: Receta Simple

Zetirol®



Nombre: ZETIROL COMPRIMIDOS 10 mg

Principio Activo: EZETIMIBA

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 28 Comprimidos

Indicaciones:

- **Hipercolesterolemia primaria:** Administrado con un inhibidor de la HMG-CoA reductasa (estatina) o solo, Ezetimiba está indicada como tratamiento adjunto a la dieta para disminuir las concentraciones elevadas de colesterol total (C-total), colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (C- LDL), apolipoproteína B (Apo B), triglicéridos y colesterol no asociado a lipoproteínas de alta densidad (no-C-HDL) y para aumentar el colesterol de alta densidad en pacientes con hipercolesterolemia primaria (familiar heterocigótica y no familiar). Administrado en una combinación con Fenofibrato, está indicado como terapia adjunta a la dieta para la reducción del C-total elevado, C-LDL, Apo B, y del no-C-HDL, en pacientes con hiperlipidemia mixta.
- **Hipercolesterolemia Familiar Homocigota (HFHo):** Administrado con una estatina, está indicado para disminuir las concentraciones elevadas de C-total y de C-LDL, en los pacientes con HFHo. Los pacientes pueden recibir también tratamientos adyuvantes (por ejemplo, aféresis de LDL).
- **Sitosterolemia Homocigota (Fitosterolemia):** Está indicado como tratamiento adjunto a la dieta para disminuir las concentraciones elevadas de sitosterol y campesterol, en los pacientes con sitosterolemia familiar homocigota.

Composición: 10 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-24372

Condición de Venta: Receta Simple

Zetirol S®

Nombre:

- ZETIROL S COMPRIMIDOS 10/10 mg
- ZETIROL S COMPRIMIDOS 10/20 mg

Principio Activo: EZETIMIBA/SIMVASTATINA

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 28 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones:

- **Prevención de la enfermedad cardiovascular:**

Ezetimiba con Simvastatina se indica para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares (muerte por causa cardiovascular, infarto del miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal, hospitalización por angina inestable o necesidad de revascularización) en pacientes con enfermedad coronaria (EC);

- **Hipercolesterolemia Primaria:** Ezetimiba con Simvastatina está indicado como tratamiento adjunto a la dieta para disminuir las concentraciones elevadas de colesterol total, colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (C-LDL), apolipoproteína B (Apo B), triglicéridos y colesterol no asociado a lipoproteínas de alta densidad (C-no-HDL) y para aumentar el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (C-HDL) en los pacientes con hipercolesterolemia primaria (familiar heterocigota y no familiar) o con hiperlipidemia mixta.



- **Hipercolesterolemia Familiar Homocigota:** Ezetimiba con Simvastatina está indicado para disminuir las concentraciones elevadas de colesterol total y de C-LDL en los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica como tratamiento adjunto a otros tratamientos para reducir lípidos (por ejemplo, LDL-aféresis) o si no se dispone de esos otros tratamientos.

Composición: 10/10 mg; 10/20 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-24372; F-24408

Condición de Venta: Receta Simple



Nombre: BRECASTA Solución concentrada para perfusión 80 mg/ 2 mL, con solvente (DOCETAXEL)

Principio Activo: DOCETAXEL

Grupo Terapéutico: Oncológicos

Presentación:

- 1 Frasco ampolla de solución concentrada 2 mL
- 1 Frasco ampolla de solvente 6 mL

Indicaciones: Tratamiento adyuvante para cáncer de mama. DOCETAXEL en combinación con doxorubicina y ciclofosfamida está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con:

- cáncer de mama operable con ganglios positivos.
- cáncer de mama operable, con ganglios negativos (con uno o más factores de riesgo elevados). Doxorubicina y ciclofosfamida seguidos por DOCETAXEL en combinación con trastuzumab (AC-TH) está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama posible de tratamiento quirúrgico cuyos tumores sobreexpresan HER2.
- **DOCETAXEL en combinación con trastuzumab**, y carboplatino (TCH) está indicado para el tratamiento complementario de pacientes con cáncer de mama operable cuyos tumores sobreexpresan HER2. Cáncer de mama metastásico.
- **DOCETAXEL en combinación con doxorubicina** está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico que no recibieron previamente terapia citotóxica para esta enfermedad.
- **DOCETAXEL en combinación con trastuzumab** está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico cuyos tumores sobreexpresan HER2 y que no recibieron previamente quimioterapia para la enfermedad metastásica.
- **DOCETAXEL como monoterapia** está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la terapia citotóxica. La quimioterapia previa debe haber incluido una antraciclina o un agente alquilante.

- **DOCETAXEL en combinación con capecitabina** está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la quimioterapia citotóxica. La terapia previa debe haber incluido una antraciclina.

CÁNCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS:

- **DOCETAXEL en combinación con cisplatino** está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico no resecable, en los pacientes que no recibieron previamente quimioterapia para esta enfermedad.
- DOCETAXEL está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la quimioterapia previa.

CÁNCER DE OVARIO: Después del fracaso de la quimioterapia de primera línea o subsiguiente.

CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO: DOCETAXEL en combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo está indicado para el tratamiento de inducción de pacientes con carcinoma epidermoide de cabeza y cuello localmente avanzado.

CÁNCER DE PRÓSTATA: DOCETAXEL en combinación con prednisona o prednisolona está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico independiente del andrógeno (refractario a hormonas).

ADENOCARCINOMA GÁSTRICO: DOCETAXEL en combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo está indicado para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no recibieron quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.

Composición: 80 mg/2 mL

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Solución concentrada para perfusión con solvente

Registro sanitario: F-24766

Condición de Venta: Receta Simple

Brezar®



Nombre: BREZAR LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 1000 mg (GEMCITABINA)

Principio Activo: GEMCITABINA

Grupo Terapéutico: Oncológicos

Presentación: 1 frasco con liofilizado para solución inyectable

Indicaciones:

- **Cáncer de Vejiga:** BREZAR (gemcitabina) en combinación con cisplatino está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga localmente avanzado o metastásico.
- **Cáncer de Páncreas:** BREZAR (gemcitabina) está indicado en el tratamiento del cáncer de páncreas en pacientes con enfermedad localmente avanzada no resecable (Estadio II o III) o metastásica (Estadio IV). Gemcitabina está indicado también, en pacientes que recibieron previamente 5-fluorouracilo.
- **Cáncer Pulmonar de Células No-Pequeñas:** BREZAR (gemcitabina) está indicado en combinación con cisplatino como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas no operable, localmente avanzado (Estadio IIIA o IIIB) o metastásico (Estadio IV).
- **Cáncer de Ovario:** BREZAR (gemcitabina) en combinación con carboplatino está indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma epitelial ovárico localmente avanzado o metastásico y en pacientes que han recaído después de un mínimo de 6 meses de finalizada una terapia de primera línea basada en platinos.
- **Cáncer de Mama:** BREZAR (gemcitabina) en combinación con paclitaxel está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama con recurrencia local o metastásico, no resecable, que han recaído después de quimioterapia adyuvante/neoadyuvante. La quimioterapia previa debe haber incluido una antraciclina a menos que estuviera clínicamente contraindicada.

Composición: 1000 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

Registro sanitario: F-24830

Condición de Venta: Receta Simple

Amrodil®

Nombre:

- AMRODIL JARABE 15 mg/5 mL (AMBROXOL CLORHIDRATO)
- AMRODIL JARABE 30 mg/5 mL (Ambroxol Clorhidrato)

Principio Activo: AMBROXOL CLORHIDRATO

Grupo Terapéutico: Respiratorio

Presentación: 100 mL de Jarabe

Indicaciones: Indicado para el alivio de la tos producida por estados gripales. No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, asma, enfisema o en toses secas.

Composición: 15 mg/5 mL; 30 mg/5 mL

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: JARABE

Registro sanitario: F-27182; F-27184

Condición de Venta: Directa



Lukem®



Nombre:

- LUKEM 5 COMPRIMIDOS MASTICABLES 5 mg (MONTELUKAST)
- LUKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg (MONTELUKAST)

Principio Activo: Montelukast sódico

Grupo Terapéutico: Respiratorio

Presentación: 30 Comprimidos masticables (5 mg) o 30 Comprimidos recubiertos (10 mg)

Indicaciones: Está indicado en pacientes adultos y pediátricos de 12 meses de edad o mayores para la profilaxis y tratamiento crónico del asma. Está indicado para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica (rinitis alérgica estacional en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores, y rinitis alérgica perenne en adultos y pacientes pediátricos de 6 meses de edad y mayores).

Composición:

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos masticables (5 mg); Comprimidos recubiertos (10 mg)

Registro sanitario: F-25477; F-27476; F-25883

Condición de Venta: Receta Simple

Gestrokem®

Nombre: GESTROKEM COMPRIMIDOS 1,5 mg (LEVONORGESTREL)
Principio Activo: Levonorgestrel
Grupo Terapéutico: Salud Femenina
Presentación: 1 Comprimido
Indicaciones: Está indicado como anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes de haber mantenido relaciones sexuales sin protección, en caso de violación o cuando falla el método anticonceptivo utilizado.
Composición: 1,5 mg
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Comprimidos
Registro sanitario: F-25690
Condición de Venta: Directa



Gestrokem-E 28®



Nombre: GESTROKEM-E 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Principio Activo: ETINILESTRADIOL/LEVONORGESTREL
Grupo Terapéutico: Salud femenina
Presentación: 28 Comprimidos recubiertos
Indicaciones: Anticoncepción oral
Composición: 0,03/0,15 mg
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos
Registro sanitario: F-25613
Condición de Venta: Receta Simple

Erxya®



Nombre:

- ERXYA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg (TADALAFILO)
- ERXYA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 mg (TADALAFILO)

Principio Activo: TADALAFILO

Grupo Terapéutico: Salud Masculina

Presentación: 4 y 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil. Para que sea efectivo es necesaria la estimulación sexual, el uso no está indicado en mujeres.

- **Hiperplasia prostática benigna:** está indicada para el tratamiento de los signos y síntomas de la hiperplasia prostática benigna.
- **Disfunción eréctil e hiperplasia prostática benigna:** está indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil y los signos y síntomas de la hiperplasia prostática benigna.

Posología:

- **Disfunción eréctil en hombres adultos:** En general, la dosis recomendada es de 10 mg tomados antes de la actividad sexual prevista, con o sin alimentos. En aquellos pacientes en los que tadalafilo 10 mg no produzca el efecto adecuado, se puede probar con la dosis de 20 mg. Puede tomarse desde al menos 30 minutos antes de la actividad sexual. La frecuencia máxima de dosificación es de un comprimido una vez al día. Tadalafilo 10 y 20 mg se utilizarán antes de la actividad sexual prevista y no se recomienda su uso diario continuo.
- **Hiperplasia benigna de próstata en hombres adultos:** La dosis recomendada es de 5 mg tomados una vez al día, aproximadamente a la misma hora, con o sin alimentos. La dosis recomendada para hombres adultos que estén siendo tratados tanto para la hiperplasia benigna de próstata como para la disfunción eréctil es también de 5 mg tomados una vez al día, aproximadamente a la misma hora. Aquellos pacientes que no puedan tolerar tadalafilo 5 mg para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata deben considerar una alternativa terapéutica, ya que no se ha demostrado la eficacia de tadalafilo 2,5 mg para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata.

Composición: 5 mg; 20 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-24323; F-24274

Condición de Venta: Receta Simple

Finaflux®

Nombre:

- FINAFLUX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1 mg
- FINAFLUX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg (FINASTERIDA)

Principio Activo: Finasterida

Grupo Terapéutico: Salud Masculina

Presentación: 30 y 90 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de alopecia androgénica en varón adulto

Composición: 1 mg; 5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-23068; F-21444

Condición de Venta: Receta Simple



Anzap®



Nombre:

- ANZAP COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg
- ANZAP COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg

Principio Activo: OLANZAPINA

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: La Olanzapina está indicada para el tratamiento agudo y de mantención de la esquizofrenia y otras psicosis en que son predominantes síntomas positivos como alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento, hostilidad y desconfianza y/o síntomas negativos como disminución afectiva, aislamiento emocional y social y pobreza de lenguaje. La Olanzapina también mejora los síntomas afectivos secundarios asociados frecuentemente con la esquizofrenia y otras alteraciones relacionadas. La Olanzapina es efectiva en la mantención de la mejoría clínica durante el tratamiento continuo en pacientes que han demostrado al tratamiento inicial. La Olanzapina está indicada para el tratamiento a corto plazo (3 a 4 semanas) de episodios maníacos agudos (con o sin un curso cíclico rápido: con o sin rasgos psicóticos) asociados a desorden bipolar tipo I, ya sea como monoterapia o asociado a Litio o Valproatos.

Composición: 5 mg; 10 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-20066; F-20065

Condición de Venta: Receta Simple

Aroxime®

Nombre: AROXIME COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 mg (PAROXETINA)

Principio Activo: PAROXETINA

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Adultos. Trastorno Depresivo Mayor: Aroxime está indicado para el tratamiento del trastorno depresivo mayor (MDD). Trastornos de Ansiedad: Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del Trastorno de Pánico con o sin agorafobia. Tratamiento del Trastorno de Ansiedad Social/Fobia Social. Tratamiento y Prevención de la recurrencia del Trastorno de Ansiedad Generalizada. Tratamiento del Trastorno de Stress Post-Traumático.

Composición: 20 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-27380

Condición de Venta: Receta Simple



Brexakem®



Nombre:

- BREXAKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 0,25 mg (BREXPIPIRAZOL)
- BREXAKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 0,5 mg (BREXPIPIRAZOL)
- BREXAKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1 mg (BREXPIPIRAZOL)
- BREXAKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2 mg (BREXPIPIRAZOL)
- BREXAKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 3 mg (BREXPIPIRAZOL)
- BREXAKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 4 mg (BREXPIPIRAZOL)

Principio Activo: BREXPIPIRAZOL

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Indicaciones: Brexipirazol está indicado en pacientes adultos para: Administrar como tratamiento adyuvante a los antidepresivos, para el tratamiento del trastorno depresivo mayor (TDM). Tratamiento de la esquizofrenia.

Composición: 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-27770; F-27771; F-27772; F-27773; F-27768; F-27769

Condición de Venta: Receta Simple

Citam®

Nombre:

- CITAM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg (ESCITALOPRAM)
- CITAM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 mg (ESCITALOPRAM)

Principio Activo: ESCITALOPRAM

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de trastornos depresivos mayores y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

Composición: 10 mg; 20 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-27365; F-27366

Condición de Venta: Receta Simple



Coxepta®



Nombre:

- COXEPTA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 300 mg (OXCARBAZEPINA)
- COXEPTA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg (OXCARBAZEPINA)

Principio Activo: OXCARBAZEPINA

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: COXEPTA está indicado para el tratamiento de convulsiones epilépticas parciales (lo que incluye los subtipos de convulsiones simples, complejas y parciales que progresan a convulsiones generalizadas secundarias), y de convulsiones generalizadas tonicoclónicas en adultos y niños desde 4 años de edad. COXEPTA está indicado como antiepiléptico de primera elección, ya sea en monoterapia o como tratamiento complementario. COXEPTA puede reemplazar otros antiepilépticos cuando el tratamiento actual produce un control insuficiente de las convulsiones.

Composición: 300 mg; 600 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-24955; F-24956

Condición de Venta: Receta Simple

Diprotan®

Nombre:

- DIPROTAN CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 30 mg
- DIPROTAN CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 60 mg

Principio Activo: DULOXETINA

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 30 Gránulos con Recubrimiento Entérico

Indicaciones: Indicado para el tratamiento del desorden depresivo mayor, el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, el manejo del dolor neuropático asociado con neuropatía periférica de origen diabético, tratamiento de fibromialgia y para el tratamiento del dolor crónico del músculo esquelético.

Composición: 30 mg; 60 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Gránulos con Recubrimiento Entérico

Registro sanitario: F-22110; F-22123

Condición de Venta: Receta Simple



Donap®



Nombre: DONAP COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg (DONEPEZILO CLORHIDRATO)

Principio Activo: Donepezilo

Grupo Terapéutico: Sistema Nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la demencia leve a moderada de tipo Alzheimer.

Composición: 10 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-24906

Condición de Venta: Receta Simple

Gabata®

Nombre:

- GABATA CÁPSULAS 300 mg
- GABATA CÁPSULAS 400 mg

Principio Activo: Gabapentina

Grupo Terapéutico: Sistema Nervioso

Presentación: 30 Cápsulas

Indicaciones:

• **Epilepsia:**

- Gabapentina está indicada como monoterapia en el tratamiento de convulsiones parciales con y sin generalización secundaria en adultos y adolescentes de 12 años de edad y mayores.

- Gabapentina está indicada como terapia coadyuvante en el tratamiento de las convulsiones parciales con y sin generalización secundaria en adultos y niños de 3 años de edad y mayores.

• **Dolor neuropático:** Gabapentina está indicada para el tratamiento del dolor neuropático periférico como dolor neuropático diabético o neuralgia post-herpética en adultos y adolescentes de 12 años de edad y mayores.

Composición: 300 mg; 400 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas

Registro sanitario: F-25090; F-25471

Condición de Venta: Receta Simple



Levera®



Nombre:

- LEVERA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500 mg (LEVETIRACETAM)
- LEVERA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1000 mg (LEVETIRACETAM)

Principio Activo: Levetiracetam

Grupo Terapéutico: Sistema Nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Indicado como monoterapia, en el tratamiento de la crisis de inicio parcial, con o sin generalización secundaria; en paciente mayores de 16 años con un nuevo diagnóstico de epilepsia. Indicado como terapia concomitante:

- En el tratamiento de la crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en adultos y niños mayores de 4 años con epilepsia.
- En el tratamiento de las crisis mioclónicas en adultos y adolescentes mayores de 12 años con epilepsia mioclónica juvenil.
- En el tratamiento de las crisis tónico-clónicas generalizadas primarias en adultos y adolescentes mayores de 12 años con epilepsia generalizada idiopática.

Composición: 500 mg; 1000 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-27496; F-27494

Condición de Venta: Receta Simple

Nortium®

Nombre:

- NORTIUM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 25 mg
- NORTIUM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 mg
- NORTIUM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg

Principio Activo: QUETIAPINA

Grupo Terapéutico: Sistema Nervioso

Presentación: 30 y 60 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento de episodios maníacos asociados con el trastorno bipolar. Episodios depresivos asociados con el trastorno bipolar. Prevención de recurrencias en el tratamiento de mantención del desorden bipolar (episodios maníacos, mixtos o depresivos) en combinación con litio o valproato.

Composición: 25 mg; 100 mg; 200 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-21868; F-21869; F-22917

Condición de Venta: Receta Simple



Nortium XR®



Nombre:

- NORTIUM XR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 50 mg (QUETIAPINA)
- NORTIUM XR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 150 mg (QUETIAPINA)
- NORTIUM XR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 200 mg (QUETIAPINA)
- NORTIUM XR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 300 mg (QUETIAPINA)

Principio Activo: QUETIAPINA

Grupo Terapéutico: Sistema Nervioso

Presentación: 30 y 60 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Esquizofrenia (agudo y mantenimiento). Trastorno bipolar incluyendo: o Episodios maníacos asociados con trastorno bipolar o Episodios de depresivos asociados con el trastorno bipolar Quetiapina está indicado en la prevención de la recurrencia del trastorno bipolar en pacientes cuyo episodio maníaco, mixto o depresivo haya respondido al tratamiento con Quetiapina.

Composición: 50 mg; 150 mg; 200 mg; 300 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos de Liberación Prolongada

Registro sanitario: F-24673; F-24037; F-24038; F-24039

Condición de Venta: Receta Simple

Pentitor®

Nombre:

- PENTINOR CÁPSULAS 50 mg (PREGABALINA)
- PENTINOR CÁPSULAS 75 mg (PREGABALINA)
- PENTINOR CÁPSULAS 150 mg (PREGABALINA)

Principio Activo: PREGABALINA

Grupo Terapéutico: Sistema Nervioso

Presentación: 40 Cápsulas

Indicaciones:

- **Dolor Neuropático:** Pregabalina está indicada para el tratamiento del dolor neuropático en adultos.
- **Epilepsia:** Pregabalina está indicada como terapia adyuvante en adultos con convulsiones parciales con o sin generalización secundaria.
- **Trastorno de Ansiedad Generalizada:** Pregabalina está indicada en el Tratamiento de Ansiedad Generalizada (TAG) en adultos.
- **Fibromialgia:** Pregabalina está indicada para el manejo del síndrome de fibromialgia.

Composición: 50 mg; 75; 150 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas

Registro sanitario: F-27228; F-23514; F-23513

Condición de Venta: Receta Simple



Prilan®



Nombre:

- PRILAN COMPRIMIDOS 10 mg (ARIPIPAZOL)
- PRILAN COMPRIMIDOS 15 mg (ARIPIPAZOL)

Principio Activo: ARIPIPAZOL

Grupo Terapéutico: Sistema Nervioso

Presentación: 30 Comprimidos

Indicaciones: Tratamiento de la esquizofrenia en adultos. Tratamiento de episodios maníacos agudos y mixtos asociados con trastorno bipolar como monoterapia o como terapia coadyuvante con litio o valproato en adultos.

Composición: 10 mg; 15 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-24262; F-24251

Condición de Venta: Receta Simple

Rangar®

Nombre: RANGAR COMPRIMIDOS 1 mg (RASAGILINA)

Principio Activo: RASAGILINA

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 30 Comprimidos

Indicaciones: Está indicado para el tratamiento de signos y síntomas de la enfermedad de parkinson idiopática como terapia inicial y como terapia adjunta a levodopa. La efectividad de rasagilina mesilato se demostró en pacientes con enfermedad de parkinson reciente que recibieron rasagilina como monoterapia y que no estaban recibiendo ninguna terapia dopaminérgica concomitante. La efectividad de rasagilina como terapia adjunta se demostró en pacientes con enfermedad de parkinson que eran tratados con levodopa.

Composición: 1 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-22834

Condición de Venta: Receta Simple



Venlakem®



Nombre:

- VENLAKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 37,5 mg (VENLAFAXINA)
- VENLAKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 75 mg (VENLAFAXINA)
- VENLAKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 150 mg (VENLAFAXINA)

Principio Activo: VENLAFAXINA

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada

Indicaciones: La venlafaxina está indicada en:

- Tratamiento de depresiones mayores asociadas o no a estados de ansiedad.
- Tratamiento del trastorno o desorden de ansiedad generalizada.
- Prevención de relapso de un episodio de depresión o prevención de la recurrencia de nuevos episodios depresivos.
- Tratamiento del desorden de ansiedad social, también conocido como fobia, como se define en DSM-IV.
- Tratamiento del trastorno de pánico con o sin agorafobia.

Composición: 37,5 mg; 75 mg; 150 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada

Registro sanitario: F-26006; F-26533; F-26007

Condición de Venta: Receta Simple

Vigakem®

Nombre: VIGAKEM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500 mg (VIGABATRINA)

Principio Activo: VIGABATRINA

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 60 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: En combinación con otros medicamentos antiepilépticos, en el tratamiento de los pacientes con epilepsia parcial resistente, con o sin generalización secundaria, es decir, en la que otras combinaciones de medicamentos han mostrado ser inadecuadas o mal toleradas. Tratamiento en monoterapia de los espasmos infantiles (síndrome de West).

Composición: 500 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-27160

Condición de Venta: Receta Simple



Queferox®



Nombre: QUEFEROX COMPRIMIDOS DISPENSABLES 500 mg (DEFERASIROX)

Principio Activo: DEFERASIROX

Grupo Terapéutico: Otros

Presentación: 30 Comprimidos Dispensables

Indicaciones: Indicado para el tratamiento de la sobrecarga crónica de hierro debida a transfusiones sanguíneas (hemosiderosis transfusional) en adultos y niños a partir de los dos años de edad. Deferasirox también está indicado para el tratamiento de la sobrecarga crónica de hierro en pacientes de por lo menos 10 años de edad que padecen síndromes talasémicos no dependientes de transfusiones.

Composición: 500 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Dispensables

Registro sanitario: F-24014

Condición de Venta: Receta Simple

Solicend®

Nombre: SOLICEND COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg

Principio Activo: Solifenacina

Grupo Terapéutico: Otros

Presentación: 10 y 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Indicado para el alivio de los síntomas de frecuencia urinaria, incontinencia o urgencia urinaria asociados con la vejiga hiperactiva.

Composición: 5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-24309

Condición de Venta: Receta Simple





Genéricos

Cetirizina Diclorhidrato



Nombre: CETIRIZINA DICLORHIDRATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg

Principio Activo: CETIRIZINA DICLORHIDRATO

Grupo Terapéutico: Alergias

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones:

- **Adultos y niños de 6 meses en adelante:** Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica perenne y tratamiento del prurito y de la urticaria idiopática crónica.
- **Adultos y niños de 2 años en adelante:** Tratamiento sintomático de la rinitis y de conjuntivitis estacionales.

Composición: 10 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-23110; F-26057

Condición de Venta: Receta Simple

Desloratadina

Nombre: DESLORATADINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg

Principio Activo: DESLORATADINA

Grupo Terapéutico: Alergias

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Desloratadina está indicada en adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad para el alivio de los síntomas asociados con: Rinitis alérgica. Urticaria.

Composición: 5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-25943

Condición de Venta: Receta Simple



Hidrocortisona



Nombre: HIDROCORTISONA CREMA TÓPICA 1%

Principio Activo: Hidrocortisona

Grupo Terapéutico: Alergias

Presentación: 15 g

Indicaciones: Tratamiento tópico de alteraciones inflamatorias y alérgicas que responden a la corticoterapia. Dermatitis inflamatorias o alérgicas, urticarias, eritemas solares, picaduras de insectos, eccemas y psoriasis.

Composición: 1g

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Crema tópica

Registro sanitario: F-26900

Condición de Venta: Receta Simple

Levocetirizina Diclorhidrato

Nombre: LEVOCETIRIZINA DICLORHIDRATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg

Principio Activo: Levocetirizina Diclorhidrato

Grupo Terapéutico: Alergias

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones:

- Alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica estacional en adultos y niños de 2 años y más;
- Alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica perenne en adultos y niños desde los 6 meses de edad;
- Tratamiento de manifestaciones cutáneas no complicadas relacionadas con la urticaria idiopática crónica en adultos y niños desde los 6 meses.

Composición: 5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-25085

Condición de Venta: Receta Simple



Loratadina

Nombre: LORATADINA COMPRIMIDOS 10 mg

Principio Activo: Loratadina

Grupo Terapéutico: Alergias

Presentación: 30 Comprimidos

Indicaciones: Alivio de síntomas de cuadros alérgicos en general, rinitis alérgica (rinitis alérgicas estacionales, perenne polinosis, fiebre de heno), afecciones alérgicas cutáneas y ardor ocular.

Composición: 10 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-24616

Condición de Venta: Receta Simple



Mometasona Furoato

Nombre: MOMETASONA FUROATO CREMA TÓPICA 0,1%

Principio Activo: Mometasona Furoato

Grupo Terapéutico: Alergias

Presentación: 15 g

Indicaciones: Alivio de las manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis que responden a corticosteroides como psoriasis y dermatitis atópica.


Composición: 0,1 g

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Crema tópica

Registro sanitario: F-28424

Condición de Venta: Receta Simple



Celecoxib



Nombre: CELECOXIB CÁPSULAS 200 mg

Principio Activo: CELECOXIB

Grupo Terapéutico: Analgésicos

Presentación: 10 y 30 Cápsulas

Indicaciones: Tratamiento sintomático de la osteoartritis y de la artritis reumatoide. Alivio de los signos y síntomas de la espondilitis anquilosante. Manejo del dolor agudo. Tratamiento de la dismenorrea primaria.

Composición: 200 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas

Registro sanitario: F-22885; F-23110; F-26316; F-27438; F-28011

Condición de Venta: Receta Simple

Ibuprofeno (Cápsulas blandas)

Nombre: IBUPROFENO CAPSULAS BLANDAS 400 mg

Principio Activo: Ibuprofeno

Grupo Terapéutico: Analgesia

Presentación:

Indicaciones: Tratamiento sintomático de estados dolorosos leves a moderados y de la fiebre.

Composición: 400 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas blandas

Registro sanitario: F-28210

Condición de Venta: Receta Simple



Ibuprofeno (Comprimidos Recubiertos)

Nombre:

• IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg

• IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg

• IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg

Principio Activo: Ibuprofeno

Grupo Terapéutico: Analgesia

Presentación: 20 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento sintomático de estados inflamatorios dolorosos, leves a moderados y/o estados febriles. Tratamiento de la dismenorrea primaria. Alivio de los síntomas y signos de artritis reumatoídea y osteoartritis.

Composición: 200 mg; 400 mg; 600 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-20393; F-20047; F-20013

Condición de Venta: Directa



Ibuprofeno (Suspensión Oral)

Nombre:

- IBUPROFENO SUSPENSIÓN ORAL 100 mg / 5 mL
- IBUPROFENO SUSPENSIÓN ORAL 200 mg / 5 mL

Principio Activo: Ibuprofeno

Grupo Terapéutico: Analgesia

Presentación: 100 mL y 120 mL

Indicaciones: Alivio de procesos inflamatorios y dolorosos de tejidos blandos y músculo esqueléticos y para reducir la temperatura en cuadros febriles.

Composición: 100 mg/5 mL; 200 mg/5 mL

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Suspensión Oral

Registro sanitario: F-27278; F-27279

Condición de Venta: Receta Simple



Ketoprofeno

Nombre: KETOPROFENO GEL TÓPICO 2,5%

Principio Activo: Ketoprofeno

Grupo Terapéutico: Analgesia

Presentación: 60 g

Indicaciones: Alivio del dolor o inflamación postraumática, como fracturas, luxaciones, esguinces, desgarró muscular, torciones, distensiones, contusiones, lumbalgias, dorsalgias.

Composición: 2,5%

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Gel tópico

Registro sanitario: F-24863

Condición de Venta: Directa



Tramadol Clorhidrato/Paracetamol

Nombre: TRAMADOL CLORHIDRATO/PARACETAMOL 37,5/325 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Principio Activo: Tramadol Clorhidrato/Paracetamol

Grupo Terapéutico: Analgésicos

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Indicado en el manejo del dolor moderado a severo, agudo y crónico.

Composición: 37,5/325 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-26075

Condición de Venta: Receta Retenida



Latanoprost



Nombre: LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 mcg/mL

Principio Activo: Latanoprost

Grupo Terapéutico: Antiglaucomatosos

Presentación: 1 frasco con 2,5 mL

Indicaciones: Tratamiento de glaucoma de ángulo abierto e hipertensión ocular, en pacientes que no toleran o que responden de forma insuficiente a cualquier otra medicación indicada para la disminución de la presión intraocular.

Composición: 50 mcg/mL

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Solución Oftálmica

Registro sanitario: F-24791

Condición de Venta: Receta Simple

Timolol

Nombre: TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5 %

Principio Activo: Timolol

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 1 frasco con 10 mL

Indicaciones: Está indicado para el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto, o glaucoma afáquico, hipertensión intraocular.

Composición: 0,5%

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Solución Oftálmica

Registro sanitario: F-22975

Condición de Venta: Receta Simple



Travoprost



Nombre: TRAVOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,004 %

Principio Activo: TRAVOPROST

Grupo Terapéutico: Antiglaucomatosos

Presentación: 1 frasco con 2,5 mL

Indicaciones: Indicado para la reducción de la presión intraocular elevada en pacientes con hipertensión ocular o con glaucoma de ángulo abierto.

Composición: 0,004%

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Solución Oftálmica

Registro sanitario: F-24800

Condición de Venta: Receta Simple

Aciclovir

Nombre: ACICLOVIR CREMA TÓPICA 5 %

Principio Activo: ACICLOVIR

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 5 y 15 g

Indicaciones: Tratamiento de infecciones mucocutáneas por herpes simple tipo I y II (labial y genital) y coadyuvante en el tratamiento de herpes zoster.

Composición: 5%

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: CREMA TÓPICA

Registro sanitario: F-24737

Condición de Venta: Receta Simple



Amoxicilina/Ácido Clavulánico

Nombre:

- AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500/125 mg
- AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULANICO 875/125 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Principio Activo: AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 20 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, tracto urinario, de piel y tejidos blandos, sepsis intraabdominal, osteomielitis, producidas por microorganismos sensibles y productores de beta lactamasas demostrado por antibiograma.

Composición: 500/125 mg; 875/125 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Registro sanitario: F-25177; F-25245

Condición de Venta: Receta Simple



Azitromicina

Nombre: AZITROMICINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500 mg

Principio Activo: AZITROMICINA

Grupo Terapéutico: Inmunosupresores

Presentación: 3 y 6 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Azitromicina está indicada para infecciones causadas por organismos susceptibles, infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo bronquitis y neumonía; en infecciones de la piel y tejidos blandos; en otitis media aguda y en infecciones del tracto respiratorio superior, incluyendo sinusitis y faringitis/amigdalitis. Tratamiento de infecciones genitales no complicadas, en hombres y mujeres, debido a *Chlamydia trachomatis*. También está indicada en el tratamiento del chancro blando debido a *Haemophilus ducreyi* y en la infección genital no complicada debida a *Neisseria gonorrhoea* no multiresistente. Se debe excluir la infección concomitante con *Treponema pallidum*.

Composición: 500 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-21866

Condición de Venta: Receta Simple



Cefuroxima



Nombre: CEFUROXIMA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500 mg

Principio Activo: CEFUROXIMA

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 14 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles, tales como infecciones de las vías respiratorias superiores, infecciones de las vías respiratorias inferiores, infecciones de las vías genitourinarias, infecciones de la piel y tejidos blandos, gonorrea, uretritis gonocócica aguda no complicada, y cervicitis, tratamiento de la enfermedad de Lyme temprana, y prevención subsiguiente de la enfermedad de Lyme tardía, en adultos y niños mayores de 12 años de edad.

Composición: 500 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-21410

Condición de Venta: Receta Retenida

Ciprofloxacino

Nombre: CIPROFLOXACINO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500 mg

Principio Activo: CIPROFLOXACINO

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 6 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento en adultos de infecciones del tracto respiratorio inferior, tracto urinario, prostatitis crónica, piel y su estructura y de infecciones de huesos y articulaciones producidas por bacterias gram-positivas y gram-negativas susceptibles.

Composición: 500 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-20718

Condición de Venta: Receta Retenida



Clotrimazol / Betametasona



Nombre: CLOTRIMAZOL / BETAMETASONA 1/ 0,05 CREMA TÓPICA
Principio Activo: CLOTRIMAZOL / BETAMETASONA
Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos
Presentación: 15 g
Indicaciones: Tratamiento tópico de infecciones micóticas complicadas con inflamación y prurito, causadas por hongos del género *Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum canis*, *Candida albicans* y *Malasszeria furfur*.
Composición: 1/ 0,05 g
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Crema Tópica
Registro sanitario: F-27701
Condición de Venta: Receta Simple

Clotrimazol

Nombre: CLOTRIMAZOL CREMA TÓPICA 1%
Principio Activo: CLOTRIMAZOL
Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos
Presentación: 20 g
Indicaciones: Tratamiento del pie de atleta (tinea pedis), tiña inguinal (tinea cruris) y tiña (tinea corporis).
Composición: 1%
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Crema Tópica
Registro sanitario: F-24783; F-23683
Condición de Venta: Venta Directa



Gentamicina sulfato



Nombre: GENTAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%
Principio Activo: Gentamicina sulfato
Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos
Presentación: 14 Comprimidos Recubiertos
Indicaciones: Tratamiento tópico de las infecciones de las estructuras oculares superficiales y sus anexos, causadas por organismos sensibles a la gentamicina. También está indicada en la prevención de infecciones oculares después de extraer cuerpos extraños y después de traumatismos y antes o después de una cirugía ocular.
Composición: 0,3 g
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Solución Oftálmica
Registro sanitario: B-2654
Condición de Venta: Receta Simple

Itraconazol

Nombre: ITRACONAZOL CÁPSULAS 100 mg

Principio Activo: Itraconazol

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 15 Cápsulas

Indicaciones: Itraconazol cápsulas está indicado en el tratamiento de las siguientes infecciones fúngicas:

- Tratamientos de corta duración: Candidiasis vulvovaginal, pitiriasis versicolor, dermatofitosis, queratitis fúngica y candidiasis oral.
- Tratamientos de larga duración:
 - onicomicosis causadas por dermatofitos y/o levaduras.
 - en la aspergilosis y candidiasis sistémicas.
 - criptococosis (incluyendo meningitis criptocócica).

En pacientes inmunocomprometidos con criptococosis y en todos los pacientes con criptococosis del sistema nervioso central únicamente está indicado cuando el tratamiento de primera elección ha sido considerado inapropiado o se ha comprobado que es ineficaz.

- histoplasmosis.
- esporotricosis.
- paracoccidioidomicosis.
- blastomicosis y otras micosis sistémicas o tropicales menos frecuentes.

Composición: 100 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas

Registro sanitario: F-22762

Condición de Venta: Receta Simple



Ketoconazol

Nombre: KETOCONAZOL CREMA TOPICA 2%

Principio Activo: Itraconazol

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 15 y 20 g

Indicaciones: Tratamiento de infecciones de la piel, c. tinea cruris, tinea manus y tinea pedis causadas por *Trichophyton* sp, *Microsporium* sp y *Epidermophyton* sp. Tratamiento tópico de la dermatitis seborreica asociada a infecciones por *Pityrosporum ovale*. Tratamiento tópico de la candidiasis cutánea por *Candida albicans* y de Tinea versicolor causada por *Malassezia furfur*.

Composición: 2 g

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Crema tópica

Registro sanitario: F-27345; F-24592

Condición de Venta: Receta Simple



Levofloxacin

Nombre: LEVOFLOXACINO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500 mg

Principio Activo: Levofloxacin hemihidrato

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 7 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: En adultos con infecciones de severidad leve a moderada, los comprimidos están indicados para el tratamiento de las siguientes infecciones bacterianas sensibles al fármaco: a) Infecciones respiratorias como sinusitis aguda, exacerbación aguda de la bronquitis crónica, neumonía adquirida en la comunidad, neumonía nosocomial, b) Infecciones complicadas del tracto urinario incluyendo pielonefritis, c) Infecciones no complicadas del tracto urinario, d) Infecciones de piel y tejidos blandos, e) Prostatitis.

Composición: 500 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-25119

Condición de Venta: Receta Retenida



Linezolid

Nombre: LINEZOLID COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg

Principio Activo: Linezolid

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 15 y 20 g

Indicaciones: Linezolid está indicado en el tratamiento de las siguientes infecciones causadas por cepas susceptibles de microorganismos designados: Infecciones por *Enterococcus faecium* resistente a Vancomicina, incluyendo casos con bacteremia concomitante. Neumonía nosocomial causada por *Staphylococcus aureus* (cepas resistentes y susceptibles a Meticilina) o *Streptococcus pneumoniae* (incluyendo cepas resistentes a multidrogas MDRSP*. Infecciones complicadas de la piel y de la estructura de la piel, incluyendo infecciones de pie diabético sin osteomielitis concomitante causadas por *Staphylococcus aureus* (cepas susceptibles y resistentes a Meticilina), *Streptococcus pyogenes* o *Streptococcus agalactiae*. Linezolid no ha sido estudiado en el tratamiento de úlceras de decúbito. Infecciones no complicadas a la piel y estructura de la piel causada por *Staphylococcus aureus* (solo cepas susceptibles a Meticilina) o *Streptococcus pyogenes*. Neumonía adquirida en la comunidad causada por *Streptococcus pneumoniae* (incluyendo cepas resistentes a multidrogas MDRSP*) incluyendo casos con bacteremia concomitante o por *Staphylococcus aureus* (solo cepas susceptibles a Meticilina).

Composición: 600 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-23911

Condición de Venta: Receta Simple



Mupirocina

Nombre: MUPIROCINA UNGÜENTO TÓPICO 2%

Principio Activo: MUPIROCINA

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 15 g

Indicaciones: Actúa sobre bacterias susceptibles en infecciones primarias o secundarias como piodermas primarias tales como impétigo foliculitis, forunculosis, ectima, dermatosis secundaria infectadas (eczemas), psoriasis, dermatitis atópica, herpes, epidermólisis ampollar, ictiosis, lesiones traumáticas infectadas como úlceras, quemaduras pequeñas, cortaduras, abrasiones, laceraciones, heridas, sitios de biopsia, incisiones quirúrgicas y picaduras de insectos. Además, Mupirocina ungüento puede ser usado profilácticamente para prevenir contaminaciones bacterianas en quemaduras menores, sitios de biopsia, incisiones y otras lesiones limpias. En el caso de abrasiones, cortaduras menores y heridas, el uso profiláctico de Mupirocina ungüento puede prevenir el desarrollo de infecciones y permitir que sane más rápidamente la herida impias.

Composición: 2 g

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Ungüento tópico

Registro sanitario: F-24858

Condición de Venta: Receta Simple



Terbinafina

Nombre: TERBINAFINA CLORHIDRATO CREMA TÓPICA 1%

Principio Activo: Terbinafina

Grupo Terapéutico: Antiinfecciosos

Presentación: 0 g

Indicaciones: Infecciones fúngicas de la piel causadas por dermatofitos tales como *Trichophyton* (por ej: *T. rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. violaceum*), *Microsporum canis* y *Epidermophyton floccosum*, por e: tinea pedis (pie de atleta: hongos en los pies), tinea pedis tipo plantar, tinea cruris (tiña o tinea inguinal) y tinea corporis (tiña o tinea corporal). Infecciones de la piel por levaduras, principalmente aquellas ocasionadas por el genero cándida (por ej: cándida albicans). Pitiriasis versicolor (tña o tinea versicolor) debida a *Pityrosporum orbiculare* (tambien conocida como *Malassezia furfur*).


Composición: 1%

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Crema tópica

Registro sanitario: F-24708

Condición de Venta: Receta Simple



Acetazolamida

Nombre: ACETAZOLAMIDA COMPRIMIDOS 250 mg

Principio Activo: ACETAZOLAMIDA

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 20 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Esta indicada en la reducción de la presión intraocular en la prevención o tratamiento del glaucoma de ángulo abierto o glaucoma secundario. Diuresis. Alcalinización de la orina. Manejo de edemas secundarios a enfermedad cardíaca congestiva o terapias con fármacos. Epilepsia tipo ausencias (Petit Mal). Prevención del mal de alturas.

Composición: 250 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-26515

Condición de Venta: Receta Simple



Amlodipino



Nombre:

• AMLODIPINO COMPRIMIDOS 5 mg;

• AMLODIPINO COMPRIMIDOS 10 mg

Principio Activo: AMLODIPINO

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos

Indicaciones:

• **Hipertensión:** Amlodipino está indicado como agente de primera línea en el tratamiento de la hipertensión y puede utilizarse como único agente para controlar la presión sanguínea en la mayoría de los pacientes. Los pacientes no adecuadamente controlados con un sólo agente antihipertensivo (otros diferentes a amlodipino), pueden resultar beneficiados con la adición de amlodipino, el cual se ha utilizado en combinación con: diuréticos tiazídicos, alfa bloqueadores, agentes bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, o inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina.

• **Angina crónica estable:** Amlodipino está indicado para el tratamiento de primera elección de la isquemia miocárdica, bien sea si ésta es ocasionada por una obstrucción fija (angina estable) y/o vasoespasmo/vasoconstricción (angina de Prinzmetal o angina variante) de la vasculatura coronaria. Amlodipino puede utilizarse en aquellos casos en donde el cuadro clínico sugiera un posible componente vasoespástico/vasoconstrictor incluso si todavía no se ha confirmado el diagnóstico de vasoespasmo /vasoconstricción. Amlodipino puede utilizarse solo como monoterapia o en combinación con otras drogas antianginosas en pacientes con angina que no respondan al tratamiento con nitratos y/o a dosis adecuadas de betabloqueadores.

Composición: 5 mg; 10 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-23832; F-19665

Condición de Venta: Receta Simple

Betahistina

Nombre:

- BETAHISTINA DICLORHIDRATO COMPRIMIDOS 16 mg
- BETAHISTINA DICLORHIDRATO COMPRIMIDOS 24 mg

Principio Activo: BETAHISTINA

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos

Indicaciones: Desórdenes patológicos por déficit microcirculatorio en el laberinto: vértigo, tinnitus, pérdida de la audición asociada al síndrome de Menière y condiciones vertiginosas correlacionadas.

Composición: 16 mg; 24 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-21866

Condición de Venta: Receta Simple



Bisoprolol Fumarato

Nombre:

- BISOPROLOL FUMARATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1,25 mg
- BISOPROLOL FUMARATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2,5 mg
- BISOPROLOL FUMARATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2,5 mg

Principio Activo: BISOPROLOL FUMARATO

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la cardiopatía coronaria. Tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica estable, en combinación con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) y diuréticos, y de manera opcional con glucósidos cardiacos.

Composición: 1,25 mg; 2,5 mg; 5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-25211; F-28217; F-25206

Condición de Venta: Receta Simple



Clopidogrel



Nombre: CLOPIDOGREL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 75 mg

Principio Activo: CLOPIDOGREL

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Clopidogrel está indicado para la reducción de los siguientes eventos aterotrombóticos en:

• **Infarto de Miocardio reciente (IM), accidente cerebrovascular isquémico reciente o enfermedad arterial periférica establecida:**

En los pacientes con historia de infarto de miocardio (IM) e infarto cerebral reciente o enfermedad arterial periférica establecida, clopidogrel ha demostrado que reduce la tasa de un parámetro combinado de nuevo infarto cerebral isquémico (fatal o no), nuevo IM (fatal o no) y otras muertes vasculares.

• **Síndrome coronario agudo:**

- Pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q), incluyendo a pacientes que han estado manejados médicamente y aquellos que han sido manejados con una intervención coronaria percutánea (con o sin stent) o cirugía de bypass arterial coronario. Clopidogrel ha demostrado que reduce la tasa de un parámetro combinado de muerte cardiovascular, IM, accidente cerebrovascular o isquemia refractaria.

- Pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, en combinación con ácido acetil salicílico (AAS) en pacientes tratados médicamente, elegibles para terapia trombolítica. En pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, se ha demostrado que clopidogrel disminuye la tasa de muerte por cualquier causa y la tasa de eventos finales combinados de muerte, re-infarto.

Clopidogrel está indicado en adultos para la prevención de eventos aterotrombóticos y tromboembólicos en:

• **Fibrilación auricular:**

- En pacientes con fibrilación auricular (FA) con riesgo aumentado de eventos cardiovasculares que pueden recibir terapia antagonista de la vitamina K (VKA). La terapia VKA ha demostrado estar asociada con mejores beneficios clínicos que el ácido acetil salicílico (AAS) solo o con la combinación de clopidogrel con AAS para la reducción de accidentes cerebrovasculares.

- En pacientes con fibrilación auricular (FA) que tienen al menos un factor de riesgo para eventos cardiovasculares y que no pueden recibir terapia VKA (por ejemplo, riesgo específico de sangrado, evaluación médica de que el paciente no es capaz de cumplir con el monitoreo del Rango Internacional Normalizado (INR, por sus siglas en inglés), o que el uso de VKA no es apropiado). Clopidogrel está indicado en combinación con AAS para la prevención de eventos aterotrombóticos y tromboembólicos, inclusive accidente cerebrovascular. Clopidogrel en combinación con AAS ha demostrado reducir la tasa del resultado final combinado para accidente cerebrovascular, infarto de miocardio (IM), embolismo sistémico no-SNC (no del sistema nervioso central) o muerte vascular, principalmente por la reducción de accidente cerebrovascular.

Composición: 75 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-25050

Condición de Venta: Receta Simple

Heparina

Nombre:

- HEPARINA SÓDICA SOLUCIÓN INYECTABLE 5000 U.I./ 5 mL
- HEPARINA SÓDICA SOLUCIÓN INYECTABLE 25.000 UI/5 mL

Principio Activo: Heparina sódica

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 25 Frascos ampolla

Indicaciones:

- **Tratamiento y profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa:** trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar.
- **Tratamiento de la enfermedad coronaria:** angina inestable e infarto de miocardio.
- Tratamiento del tromboembolismo arterial periférico.
- Tratamiento de la trombosis en la coagulación intravascular diseminada (CID). Prevención de la trombosis en el circuito de circulación extracorpórea durante la cirugía cardíaca y hemodiálisis.


Composición: 5.000 U.I./5 mL; 25.000 U.I./5 mL

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Solución Inyectable

Registro sanitario: B-2654

Condición de Venta: Receta Simple



Losartán Potásico

Nombre:

- LOSARTÁN POTÁSICO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 50 mg
- LOSARTÁN POTÁSICO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 mg

Principio Activo: Losartán Potásico

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la hipertensión. Para reducir la proteinuria y para retardar la progresión de la enfermedad renal en pacientes con diabetes tipo II, con antecedentes de hipertensión. Reducción del riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda.

Composición: 50 mg; 100 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-22000; F-21746

Condición de Venta: Receta Simple



Losartán potásico/Hidroclorotiazida

Nombre: LOSARTAN POTÁSICO/ HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Principio Activo: Losartán potásico/ Hidroclorotiazida

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Presentación: Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la hipertensión arterial en aquellos pacientes en que sea apropiado el tratamiento combinado. Indicado para reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares en pacientes con hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda.

Composición: 50/12,5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-19663

Condición de Venta: Receta Simple



Telmisartán

Nombre:

- TELMISARTÁN COMPRIMIDOS 40 mg
- TELMISARTÁN COMPRIMIDOS 80 mg

Principio Activo: Telmisartán

Grupo Terapéutico: Cardiovascular

Indicaciones: Tratamiento de la hipertensión arterial esencial. Prevención de la morbilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes de 55 años de edad y más con alto riesgo de enfermedad cardiovascular.

Composición: 40 mg; 80 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-27925; F-27924

Condición de Venta: Receta Simple



Betametasona

Nombre: BETAMETASONA CREMA TÓPICA 0,05%
Principio Activo: BETAMETASONA
Grupo Terapéutico: Corticoides
Presentación: 15 g
Indicaciones: Alivio de manifestaciones inflamatorias y pruriginosas sensibles al tratamiento con corticoides.
Composición: 0,05%
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Crema Tópica
Registro sanitario: F-25758
Condición de Venta: Receta Simple



Clobetasol Propionato



Nombre: CLOBETASOL PROPIONATO CREMA TÓPICA 0,05 %
Principio Activo: CLOBETASOL PROPIONATO
Grupo Terapéutico: Corticoides
Presentación: 25 g
Indicaciones: Tratamiento a corto plazo de manifestaciones inflamatorias y pruríticas de dermatosis que no responden a corticoides tópicos menos activos.
Composición: 0,05%
Excipientes: c.s.
Forma farmacéutica: Crema Tópica
Registro sanitario: F-27354; F-24833
Condición de Venta: Receta Simple

Esomeprazol

Nombre:

- ESOMEPRAZOL CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 20 mg
- ESOMEPRAZOL CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 40 mg

Principio Activo: Esomeprazol magnésico trihidrato

Grupo Terapéutico: Gástrico

Presentación: 30 Cápsulas con gránulos con recubrimiento entérico

Indicaciones:

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE):

- Tratamiento de la esofagitis por reflujo erosiva;
- Tratamiento preventivo a largo plazo de pacientes con esofagitis cicatrizada para evitar recaídas;
- Tratamiento sintomático de la enfermedad por reflujo gastroesofágico [ERGE].;
- Uso en adolescentes desde 12 años en el tratamiento a corto plazo de reflujo gastroesofágico. En pacientes que necesitan de un tratamiento continuo con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), pacientes mayores de 18 años en riesgo de desarrollar úlcera gástrica, se consideran pacientes en riesgo a mayores de 60 años y/o con antecedentes documentados de úlcera gástrica,

NOTA: los estudios controlados no se extienden más allá de 6 meses.

En pacientes que necesitan de un tratamiento continuo de Ácido Acetilsalicílico en dosis bajas (75-325mg):

- Prevención de úlceras gástricas y/o duodenales asociadas con el tratamiento con Ácido Acetilsalicílico en dosis bajas en pacientes en riesgo.

Composición: 20 mg; 40 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas con gránulos con recubrimiento entérico

Registro sanitario: F-24107; F-24160

Condición de Venta: Receta Simple



Famotidina

Nombre: FAMOTIDINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 mg

Principio Activo: Famotidina

Grupo Terapéutico: Gástrico

Indicaciones: Profilaxis y tratamiento de úlcera duodenal y tratamiento de úlcera gástrica. Tratamiento de estados hipersecretores gástricos. Tratamiento de síndrome de Zollinger-Ellison. Tratamiento de los síntomas gástricos de la mastocitosis sistémica. Úlcera gástrica benigna y en la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Composición: 20 mg; 40 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-27729; F-27730

Condición de Venta: Receta Simple



Azatioprina

Nombre: AZATIOPRINA COMPRIMIDOS 50 mg

Principio Activo: AZATIOPRINA

Grupo Terapéutico: Inmunosupresores

Presentación: 100 Comprimidos

Indicaciones: Se indica en el tratamiento de la enfermedad intestinal inflamatoria de grado moderado a severo (enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa) en los pacientes que requieren la administración de una terapia con corticosteroides, en aquellos incapaces de tolerar alguna terapia con corticosteroides o en los pacientes cuya enfermedad sea resistente a otra terapia estándar de primera línea. Azatioprina, ya sea solo o por lo general en combinación con corticosteroides y/u otros fármacos y procedimientos, se ha usado con beneficio clínico (el cual puede incluir reducción de la dosis o suspensión de los corticosteroides) en una proporción de pacientes que padecen lo siguiente: artritis reumatoide severa; lupus eritematoso sistémico; dermatomiositis y poliomiositis; hepatitis crónica activa autoinmune; pénfigo vulgar; poli arteritis nodosa; anemia hemolítica autoinmune; púrpura trombocitopénica idiopática crónica, resistente al tratamiento esclerosis múltiple recidivante y remitente.

Composición: 50 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-22734

Condición de Venta: Receta Simple



Letrozol

Nombre: LETROZOL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2,5 mg

Principio Activo: Letrozol

Grupo Terapéutico: Inmunosupresores

Presentación: 30 Comprimidos recubiertos

Indicaciones: El letrozol no está indicado en el cáncer de mama sin presencia de receptores hormonales. El letrozol está indicado en: Tratamiento adyuvante en mujeres posmenopáusicas afectas de cáncer de mama incipiente con receptores hormonales positivos. Tratamiento adyuvante de continuación en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama incipiente que han recibido un tratamiento adyuvante estándar previo a base de tamoxifeno. Tratamiento de primera línea en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado hormonodependiente. Tratamiento del cáncer de mama avanzado en mujeres en estado posmenopáusico natural o artificial y que han recibido con anterioridad tratamiento con antiestrógenos. Tratamiento prequirúrgico en mujeres posmenopáusicas afectas de cáncer de mama localizado con receptores hormonales positivos, a fin de facilitar la futura cirugía conservadora de la mama en mujeres que originalmente no habían sido consideradas aptas para ese tipo de cirugía. El tratamiento posquirúrgico ulterior debe ser congruente con las normas asistenciales.

Composición: 2,5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos

Registro sanitario: F-26067

Condición de Venta: Receta Simple



Sirolimus

Nombre:

- SIROLIMUS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 0.5 mg
- SIROLIMUS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1 mg

Principio Activo: Sirolimus

Grupo Terapéutico: Inmunosupresores

Presentación: 30 Cápsulas con gránulos con recubrimiento entérico

Indicaciones: Profilaxis de Rechazo de Órganos en Trasplante Renal; Sirolimus indicado para la profilaxis de rechazo de órganos en pacientes de 13 años y mayores que reciben trasplante renal. Se recomienda monitoreo terapéutico para todos los pacientes que reciben Sirolimus. En pacientes con riesgo inmunológico leve a moderado, se recomienda administrar Sirolimus en un régimen con CsA [ciclosporina] y corticoides como tratamiento inicial. La suspensión de la CsA puede ser considerada 2 a 4 meses después del trasplante. En pacientes con alto riesgo inmunológico (definidos como receptores de raza negra y/o receptores de un nuevo trasplante previo por causa inmunológica y/o pacientes con anticuerpos panel-reactivos elevados [PRA; con un nivel de PRA>80%], se recomienda que Sirolimus se use en combinación de tacrolimus y corticosteroides o ciclosporina y corticoides durante el primer año después del trasplante. La seguridad y eficacia de estas combinaciones en pacientes de alto riesgo de trasplante renal no han sido estudiadas más allá de un año. Por lo tanto, después del primer año tras el trasplante, cualquier ajuste en el régimen inmunosupresor deberá considerarse en base al estado clínico del paciente.

Composición: 0.5 mg; 1 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos

Registro sanitario: F-27177; F-27180

Condición de Venta: Receta Simple



Atorvastatina



Nombre:

- ATORVASTATINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg
- ATORVASTATINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 mg
- ATORVASTATINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 mg
- ATORVASTATINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 80 mg

Principio Activo: ATORVASTATINA

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 30 y 60 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Atorvastatina está indicada como adyuvante de la dieta para el tratamiento de pacientes con niveles elevados de colesterol total, LDL-colesterol, apolipoproteína B, y triglicéridos y para incrementar los niveles de HDL-colesterol en pacientes con hipercolesterolemia primaria (hipercolesterolemia familiar heterocigota y no familiar), hiperlipidemia combinada (mixta) (Fredrickson Tipo IIa y IIb), niveles elevados de triglicéridos séricos (Fredrickson Tipo IV), y para pacientes con disbetalipoproteinemia (Fredrickson tipo III) que no responden adecuadamente a una dieta. Atorvastatina también está indicada para la reducción de colesterol total y LDL-colesterol en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, cuando la respuesta a la dieta y otras medidas no farmacológicas son inadecuadas.

Tratamiento a pacientes hipertensos con colesterol total normal o moderadamente elevado (menor a 250 mg/dL) y que tiene asociados al menos otros tres factores de riesgo cardiovascular clásico para:

- Reducir el riesgo de enfermedad coronaria cardíaca fatal e infarto al miocardio no fatal.
- Reducir el riesgo de procedimientos de revascularización y angina pectoris. En pacientes con evidencia clínica de enfermedad coronaria cardíaca.

Atorvastatina está indicada para:

- Reducir el riesgo de infarto al miocardio no fatal,
- Reducir el riesgo de accidente vascular encefálico fatal y no fatal,
- Reducir el riesgo de procedimientos de revascularización,
- Reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca,
- Reducir el riesgo de angina.

Pacientes Pediátricos (10-17 años de edad) La atorvastatina está indicada como un adyuvante de la dieta para reducir los niveles de C-total, LDL-C y apo B en niños y niñas posmenárgicas, entre 10 a 17 años de edad, con hipercolesterolemia familiar heterocigota si después de un estudio adecuado de la terapia con dieta se encuentran presentes los siguientes hallazgos: a. LDL-C sigue siendo > 190 mg/dL o b. LDL-C sigue siendo > 160 mg/dL y: • Existe un antecedente familiar positivo de enfermedad cardiovascular prematura u • Otros dos o más factores de riesgo CVD están presentes en el paciente pediátrico.

Atorvastatina está indicada en pacientes con diabetes tipo II sin evidencia de enfermedad coronaria cardíaca, pero con múltiples factores de riesgo para enfermedad coronaria cardíaca, tales como retinopatía, albuminuria, fumador, o hipertensión para:

- Reducir el riesgo de infarto al miocardio.
- Reducir el riesgo de apoplejía o accidente vascular encefálico.

Composición: 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-23377; F-23376; F-23378; F-23379

Condición de Venta: Receta Simple

Cinacalcet



Nombre: CINACALCET COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 30 mg

Principio Activo: CINACALCET

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de hiperparatiroidismo secundario en pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis. Puede utilizarse como parte de un régimen terapéutico que incluye quelantes del fósforo y/o análogos de vitamina D, según corresponda. Reducción de la hipercalcemia en pacientes con:

- carcinoma de paratiroides.
- hiperparatiroidismo primario para los que, según sus niveles de calcio sérico, estaría indicada la paratiroidectomía (según las principales guías de tratamiento) pero que, no obstante, ésta no es clínicamente adecuada o está contraindicada.

Composición: 30 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-23767

Condición de Venta: Receta Simple

Ezetimiba / Simvastatina

Nombre:

- EZETIMIBA / SIMVASTATINA 10/10 COMPRIMIDOS
- EZETIMIBA / SIMVASTATINA 10/20 COMPRIMIDOS

Principio Activo: Ezetimiba/ Simvastatina

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 28 Comprimidos

Indicaciones:

- Hipercolesterolemia Primaria Ezetimiba con simvastatina está indicado como tratamiento adjunto a la dieta para disminuir las concentraciones elevadas de colesterol total, colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (C-LDL), apolipoproteína B (Apo B), triglicéridos, y colesterol no asociado a lipoproteínas de alta densidad (C-no-HDL) y para aumentar el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (C-HDL) en los pacientes con hipercolesterolemia primaria (familiar heterocigota y no familiar) o con hiperlipidemia mixta.
- Hipercolesterolemia Familiar Homocigota Ezetimiba con simvastatina está indicado para disminuir las concentraciones elevadas de colesterol total y de C-LDL en los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica como tratamiento adjunto a otros tratamientos para reducir lípidos (por ejemplo, LDL-aféresis) o si no se dispone de esos otros tratamientos.

Composición: 10/10 mg; 10/20 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-23419; F-23302

Condición de Venta: Receta Simple



Metformina Clorhidrato (Comprimidos de Liberación Prolongada)



Nombre:

- METFORMINA CLORHIDRATO COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 500 mg
- METFORMINA CLORHIDRATO COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 750 mg
- METFORMINA CLORHIDRATO COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1000 mg

Principio Activo: Metformina Clorhidrato

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 30 Comprimidos de Liberación Prolongada

Indicaciones: Como monoterapia está indicado en conjunto con la dieta y el ejercicio, para mejorar el control glicémico en adultos con diabetes tipo II. Puede utilizarse concomitantemente con una sulfonilurea o insulina para mejorar el control glicémico en adultos. Prevención de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con prediabetes y con al menos un factor de riesgo adicional en los cuales las modificaciones de estilo de vida por sí solos no han logrado alcanzar un control adecuado de la glicemia.

Composición:

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos de Liberación Prolongada

Registro sanitario: F-23335; F-23334; F-25083; F-25845

Condición de Venta: Receta Simple

Metformina Clorhidrato (Comprimidos Recubiertos)

Nombre: METFORMINA CLORHIDRATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 850 mg

Principio Activo: Metformina Clorhidrato

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 30 y 60 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Como monoterapia está indicado como coadyuvante de la dieta y ejercicio para disminuir la glicemia en pacientes adultos y niños mayores de 10 años con diabetes tipo II cuya hiperglicemia no puede ser controlada solamente con dieta. Puede ser empleada conjuntamente con sulfonilurea o insulina para mejorar control glicémico.

Composición: 850 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-20110

Condición de Venta: Receta Simple



Omeprazol



Nombre: OMEPRAZOL CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 20 mg

Principio Activo: OMEPRAZOL

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 30 y 60 Cápsulas con gránulos con recubrimiento entérico

Indicaciones: Tratamiento de la úlcera duodenal, úlcera gástrica, enfermedad ulcerosa péptica con histología antral o cultivo positivo para helicobacter pylori en terapia combinada con antibacterianos, esofagitis por reflujo, Síndrome Zollinger-Ellison y otras condiciones hipersecretoras.

Composición: 20 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas con gránulos con recubrimiento entérico

Registro sanitario: F-20704

Condición de Venta: Receta Simple

Pancreatina

Nombre:

- PANCREATINA 10000 CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 150 mg
- PANCREATINA 25000 CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 300 mg

Principio Activo: Pancreatina

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 20 y 50 Cápsulas con gránulos con recubrimiento entérico

Indicaciones: Tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina en pacientes pediátricos y adultos.

Composición: 150 mg; 300 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas con gránulos con recubrimiento entérico

Registro sanitario: F-28644; F-28645

Condición de Venta: Receta Simple



Rosuvastatina



Nombre:

- ROSUVASTATINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg
- ROSUVASTATINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 mg

Principio Activo: Rosuvastatina

Grupo Terapéutico: Metabólicos

Presentación: 30 Comprimidos recubiertos

Indicaciones: Rosuvastatina debe ser usado como un adyuvante a la dieta cuando la respuesta a la dieta y el ejercicio no es suficiente. Prevención de enfermedad cardiovascular primaria: Rosuvastatina está indicado para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, reducir el riesgo del infarto al miocardio, reducir el riesgo de procedimientos de revascularización en personas sin enfermedad coronaria evidente pero con un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular basado en edad: 50 años en hombres y 60 años en mujeres, hsPCR 2 mg/L, y la presencia de al menos un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular como hipertensión, HDL – C bajo, fumar, o historia familiar de enfermedad coronaria prematura. Pacientes con hiperlipidemia primaria y dislipidemia mixta para reducir los niveles totales de colesterol, LDL-C, Apo B, Colesterol no HDL y triglicéridos y para aumentar el HDL-C. Pacientes con hipertrigliceridemia. Pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica, para reducir los niveles de LDL-C, Colesterol total y Apo B. Detener la progresión de la aterosclerosis como parte de la estrategia de reducir los niveles de C total y LDL-C. También está indicado como adyuvante a la dieta para el tratamiento de pacientes con disbetalipoproteinemia primaria (hiperlipoproteinemia Fredrickson Tipo III). Niños y adolescentes de 10 a 17 años de edad con hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HeFH): En conjunto con la dieta para reducir los niveles de Colesterol total, LDL-C y Apo B en niños y niñas adolescentes cuya menarquia ocurrió al menos un año atrás, de 10 a 17 años de edad con hipercolesterolemia familiar heterocigótica si luego de un adecuado tratamiento con dieta están presentes los siguientes hallazgos: LDL-C > 190 mg/Dl ó 160 mg/Dl y antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura (ECV) ó dos o más factores de riesgo de ECV.

Composición: 10 mg; 20 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos

Registro sanitario: F-24163; F-24194

Condición de Venta: Receta Simple

Ambroxol Clorhidrato

Nombre:

- AMBROXOL CLORHIDRATO JARABE 15 mg/5 mL
- AMBROXOL CLORHIDRATO JARABE 30 mg/5 mL

Principio Activo: AMBROXOL CLORHIDRATO

Grupo Terapéutico: Respiratorio

Presentación: 100 mL de Jarabe

Indicaciones: Indicado para el alivio de la tos producida por estados gripales. No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, asma, enfisema o en toses secas.

Composición: 15 mg/5 mL; 30 mg/5 mL

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: JARABE

Registro sanitario: F-27181; F-27183

Condición de Venta: Directa



Montelukast



Nombre: MONTELUKAST COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg (MONTELUKAST)

Principio Activo: Montelukast sódico

Grupo Terapéutico: Respiratorio

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: En pacientes adultos y pediátricos de 12 meses de edad o mayores para la profilaxis y tratamiento crónico del asma. Además, está indicado para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica (rinitis alérgica estacional en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores, y rinitis alérgica perenne en adultos y pacientes pediátricos de 6 meses de edad y mayores).

Composición: 10 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-25882

Condición de Venta: Receta Simple

Levonorgestrel

Nombre: LEVONORGESTREL COMPRIMIDOS 1,5 mg

Principio Activo: Levonorgestrel

Grupo Terapéutico: Salud femenina

Presentación: 1 Comprimido

Indicaciones: Está indicado como anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes de haber mantenido relaciones sexuales sin protección, en caso de violación o cuando falla el método anticonceptivo utilizado.

Composición: 1,5 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-25689

Condición de Venta: Directa



Tamsulosina



Nombre: TAMSULOSINA CLORHIDRATO CÁPSULAS CON GRÁNULOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 0,4 mg

Principio Activo: Tamsulosina

Grupo Terapéutico: Salud masculina

Presentación: 30 Cápsulas con gránulos recubiertos de liberación prolongada

Indicaciones: Tratamiento de los síntomas funcionales de la hiperplasia prostática benigna (HPB).

Composición: 0,4 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas con gránulos recubiertos de liberación prolongada

Registro sanitario: F-24218

Condición de Venta: Receta Simple

Bromuro de Rocuronio

Nombre: BROMURO DE ROCURONIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 mg/5 mL

Principio Activo: BROMURO DE ROCURONIO

Grupo Terapéutico: Sedantes

Presentación: 10 Frascos ampolla de Solución Inyectable

Indicaciones: Está indicado como coadyuvante de la anestesia general, para facilitar la intubación traqueal tanto en rutina y en la inducción de secuencia rápida, así como conseguir la relajación de la musculatura esquelética en cirugía. Asimismo, está indicado como coadyuvante en la unidad de cuidados intensivos (UCI) para facilitar la intubación traqueal y la ventilación mecánica.

Composición: 50 mg/5 mL

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN INYECTABLE

Registro sanitario: F-24221

Condición de Venta: Receta Simple



Dexmedetomidina



Nombre: DEXMEDETOMIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE 200 mcg/ 2 mL

Principio Activo: DEXMEDETOMIDINA

Grupo Terapéutico: Sedantes

Presentación: 10 Frascos ampolla de Solución Inyectable

Indicaciones: El clorhidrato de dexmedetomidina es un sedante alfa con propiedades analgésicas indicado para uso en adultos en la unidad de cuidados intensivos. Indicado como sedante en pacientes críticos sometidos a ventilación mecánica prolongada. Sedación de pacientes no intubados durante Y/o con anterioridad a procedimientos quirúrgicos u otros.

Composición: 200 mcg/ 2 mL

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN INYECTABLE

Registro sanitario: F-24336

Condición de Venta: Receta Simple

Aripiprazol

Nombre:

- ARIPIPAZOL COMPRIMIDOS 10 mg
- ARIPIPAZOL COMPRIMIDOS 15 mg

Principio Activo: ARIPIPAZOL

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 30 Comprimidos

Indicaciones: Tratamiento de la esquizofrenia en adultos. Tratamiento de episodios maníacos agudos y mixtos asociados con desorden bipolar.

Composición: 10 mg; 15 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos

Registro sanitario: F-22899; F-22900

Condición de Venta: Receta Simple



Donepezilo



Nombre: DONEPEZILO CLORHIDRATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg

Principio Activo: Donepezilo Clorhidrato

Grupo Terapéutico: Sistema Nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la demencia leve a moderada de tipo Alzheimer.

Composición: 10 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos

Registro sanitario: F-24880

Condición de Venta: Receta Simple

Duloxetina

Nombre:

- DULOXETINA CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 30 mg
- DULOXETINA CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 60 mg

Principio Activo: Duloxetina Clorhidrato

Grupo Terapéutico: Sistema Nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la demencia leve a moderada de tipo Alzheimer.

Composición: 30 mg; 60 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas con gránulos con recubrimiento entérico

Registro sanitario: F-20783; F-20784

Condición de Venta: Receta Simple



Escitalopram



Nombre:

- ESCITALOPRAM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg
- ESCITALOPRAM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 mg

Principio Activo: Escitalopram oxalato

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la depresión y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de pánico con o sin agorafobia. Tratamiento de la ansiedad social. Tratamiento de la ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)

Composición: 10 mg; 20 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-27400; F-27401

Condición de Venta: Receta Simple

Gabapentina

Nombre:

- GABAPENTINA CÁPSULAS 300 mg
- GABAPENTINA CÁPSULAS 400 mg

Principio Activo: Gabapentina

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 30 Cápsulas

Indicaciones:

- **Epilepsia:** Gabapentina está indicada como monoterapia en el tratamiento de convulsiones parciales con y sin generalización secundaria en adultos y adolescentes de 12 años de edad y mayores. Gabapentina está indicada como terapia coadyuvante en el tratamiento de las convulsiones parciales con y sin generalización secundaria en adultos y niños de 3 años de edad y mayores.
- **Dolor neuropático:** Gabapentina está indicada para el tratamiento del dolor neuropático periférico como dolor neuropático diabético o neuralgia post-herpética en adultos y adolescentes de 12 años de edad y mayores.

Composición: 300 mg; 400 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas

Registro sanitario: F-23007; F-23006

Condición de Venta: Receta Simple



Levetiracetam



Nombre:

- LEVETIRACETAM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500 mg
- LEVETIRACETAM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1000 mg

Principio Activo: Levetiracetam

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Indicado como monoterapia, en el tratamiento de la crisis de inicio parcial, con o sin generalización secundaria; en paciente mayores de 16 años con un nuevo diagnóstico de epilepsia. Indicado como terapia concomitante:

- En el tratamiento de la crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en adultos y niños mayores de 4 años con epilepsia.
- En el tratamiento de las crisis mioclónicas en adultos y adolescentes mayores de 12 años con epilepsia mioclónica juvenil.
- En el tratamiento de las crisis tónico-clónicas generalizadas primarias en adultos y adolescentes mayores de 12 años con epilepsia generalizada idiopática.

Composición: 500 mg; 1000 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-27495; F-27493

Condición de Venta: Receta Simple

Mirtazapina

Nombre:

- MIRTAZAPINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 15 mg
- MIRTAZAPINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 30 mg

Principio Activo: Mirtazapina

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de los episodios de depresión mayor

Composición: 15 mg; 30 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos Recubiertos

Registro sanitario: F-28079; F-28078

Condición de Venta: Receta Simple



Pregabalina

Nombre:

- PREGABALINA CÁPSULAS 75 mg
- PREGABALINA CÁPSULAS 150 mg

Principio Activo: Pregabalina

Grupo Terapéutico: Sistema nervioso

Presentación: 30 Cápsulas

Indicaciones: Indicado en el tratamiento del dolor neuropático en adultos.

- **Epilepsia:** Indicado como coadyuvante en el tratamiento de convulsiones parciales, con o sin generalización secundaria, en pacientes a partir de 12 años.
- **Trastorno de ansiedad generalizada:** Indicado en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada (TAG), en adultos.
- **Fibromialgia:** Indicado en el tratamiento de fibromialgias.

Composición: 75 mg; 150 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Cápsulas

Registro sanitario: F-23005; F-22904

Condición de Venta: Receta Simple



Quetiapina (Comprimidos Recubiertos)



Nombre:

- QUETIAPINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 25 mg
- QUETIAPINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 mg
- QUETIAPINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg
- QUETIAPINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 300 mg

Principio Activo: Quetiapina

Grupo Terapéutico: Sistema Nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento de episodios maníacos asociados con el trastorno bipolar. Episodios depresivos asociados con el trastorno bipolar. Prevención de recurrencias en el tratamiento de mantención del desorden bipolar (episodios maníacos, mixtos o depresivos) en combinación con litio valproato.

Composición: 50 mg; 100 mg; 200 mg; 300 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos

Registro sanitario: F-19959; F-19960; F-19961; F-19962

Condición de Venta: Receta Simple

Quetiapina (Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada)

Nombre:

- QUETIAPINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 50 mg
- QUETIAPINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 150 mg
- QUETIAPINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 200 mg
- QUETIAPINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 300 mg

Principio Activo: Quetiapina

Grupo Terapéutico: Sistema Nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Tratamiento agudo y de mantenimiento de la Esquizofrenia. Trastorno bipolar incluyendo: Episodios maníacos asociados con el trastorno bipolar, episodios depresivos asociados con el trastorno bipolar. Tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar en combinación con litio o divalproatoácido de sodio. Desorden depresivo mayor: Tratamiento como terapia adjunta a antidepresivos para el tratamiento de trastorno depresivo mayor.

Composición: 50 mg; 100 mg; 200 mg; 300 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos de liberación prolongada

Registro sanitario: F-23022; F-23024; F-23023; F-23025

Condición de Venta: Receta Simple



Sertralina



Nombre: SERTRALINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 mg

Principio Activo: Sertralina

Grupo Terapéutico: Sistema Nervioso

Presentación: 30 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones: Sertralina está indicada para el tratamiento de los síntomas de depresión, incluyendo depresión acoñada por síntomas de ansiedad, en pacientes con o sin historia de manía. Sertralina está indicada para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Sertralina está indicada para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en niños y adolescentes (6-17 años). Sertralina está indicada para el tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Sertralina está indicada para el tratamiento del trastorno de estrés post-traumático (TEPT). Sertralina está indicada para el tratamiento de la fobia social también conocida como Trastorno de ansiedad social. Sertralina está indicada para el tratamiento del trastorno disfórico premenstrual (TDPM).

Composición: 100 mg

Excipientes: c.s.

Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos

Registro sanitario: F-25522

Condición de Venta: Receta Simple

Venlafaxina

**Nombre:**

- VENLAFAXINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 37.5 mg
- VENLAFAXINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 75 mg
- VENLAFAXINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 150 mg

Principio Activo: Venlafaxina**Grupo Terapéutico:** Sistema nervioso**Presentación:** 30 Comprimidos recubiertos de liberación prolongada**Indicaciones:** La venlafaxina está indicada en:

- Tratamiento de depresiones mayores asociadas o no a estados de ansiedad.
- Tratamiento del trastorno o desorden de ansiedad generalizada.
- Prevención de relapso de un episodio de depresión o prevención de la recurrencia de nuevos episodios depresivos.
- Tratamiento del desorden de ansiedad social, también conocido como fobia, como se define en DSM-IV.
- Tratamiento del trastorno de pánico con o sin agorafobia.

Composición: 37,5 mg; 75 mg; 150 mg**Excipientes:** c.s.**Forma farmacéutica:** Comprimidos recubiertos de liberación prolongada**Registro sanitario:** F-25995; F-26532; F-26005**Condición de Venta:** Receta Simple

Zolpidem Tartrato

Nombre: Zolpidem tartrato comprimidos recubiertos 10 mg**Principio Activo:** Zolpidem**Grupo Terapéutico:** Sistema nervioso**Presentación:** 30 Comprimidos recubiertos**Indicaciones:** Zolpidem está indicado para el tratamiento a corto plazo del insomnio, por un periodo de hasta un mes.**Composición:** 10 mg**Excipientes:** c.s.**Forma farmacéutica:** Comprimidos recubiertos**Registro sanitario:** F-25004**Condición de Venta:** Receta Retenida

Zopiclona

**Nombre:** ZOPICLONA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 7,5 mg**Principio Activo:** Zopiclona**Grupo Terapéutico:** Sistema Nervioso**Presentación:** 30 Comprimidos Recubiertos**Indicaciones:** Zopiclona está indicado en el tratamiento a corto plazo del insomnio en adultos.**Composición:** 7,5 mg**Excipientes:** c.s.**Forma farmacéutica:** Comprimidos recubiertos**Registro sanitario:** F-26759**Condición de Venta:** Receta Retenida



Ascend
LABORATORIES

